الإخفاقات المعرفية لدى بعض العينات الإكلينيكية

د: محمد فتحى على سليمان - مدرس علم النفس الاكلينيكي كلية الاداب - جامعة الفيوم

ملخص:

هدفت الدراسة الراهنة الكشف عن الفروق في الأداء على مقياس الإخفاق المعرفى بين المجموعات المرضية (مرضى الفصام ومرضى الاكتئاب ثنائي القطب، ومرضى القلق) كل منها على حدة وبين الأسوياء، وكذك الفروق في الأداء على مقياس الإخفاق المعرفى بين الذكور والإناث في كل مجموعة من المجموعات الإكلينيكية على حدة، وكذلك مجموعة الأسوياء. وأجريت الدراسة على 176 مشاركًا موزعين على أربع مجموعات تضم الأولى 44 مشاركًا من مرضى القلق، وتشمل الثانية 44 من مرضى الاكتئاب ثنائى القطب، في حين تتضمن المجموعة الثالثة 44 من مرضى الفصاء، أما المجموعة الرابعة فهي من الأسوياء الراشدين الذين لا يعانون من أي أمراض نفسية أو عقلية، وضمت هذه المجموعة المشاركًا. وقد استخدم الباحث استمارة للبيانات خاصة بالعينات المرضية. ولتقييم الإخفاق المعرفى استخدم الباحث (تمارا قاسم الدورى، 2012). وأسفرت فروق بين مجموعات الدراسة الأربعة لدى مجموعات المرضى، كذلك بينت نتائج تحليل التباين الأحادى وجود فروق بين مجموعات الدراسة الأربعة لصالح مجموعات المرضى، كذلك بينت نتائج تحليل التباين الأحادى وجود بين مجموعات الدراسة الأربعة لصالح مجموعات المعرفى لدى مرضى الفصام لصالح الذكور، ولدى مرضى الاكتئاب لصالح الإناث، وجود فروق فى الإخفاق المعرفى لدى مرضى الفصام لصالح الإناث، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية فى الإخفاقات المعرفية لدى مرضى القاق، بينما كانت الفروق فى الإخفاق المعرفى لدى عينة الأسوياء لصالح الذكور