



الدرجة: الدكتوراه

اسم الطالب: محمد أحمد حامد إسماعيل

القسم: التخدير

عنوان الرسالة : دراسة الارتباط بين التعدد الجيني لمستقبل مخدر الفنتانيل واستهلاكه كمسكن بعد عمليات استئصال الرحم الكلي عن طريق البطن في المريضات المصريات .

المشرفون:

أستاذ التخدير كلية الطب جامعة القاهرة

أ.د/ سعد البasha أحمد محمد

مدرس التخدير كلية الطب جامعة الفيوم

د/ ماجد لبيب بولس

مدرس البايثولوجيا الاكلينيكية كلية الطب جامعة القاهرة

د/ إيمان عبد المحسن شاهين

ملخص الرسالة

هذه الدراسة شملت ٦٠ مريضة مصرية خضعن لعملية استئصال الرحم الكلي عن طريق البطن ، و تم سحب عينات دم منهم لتحليل التعدد الجيني لمستقبل مخدر الفنتانيل ، ثم تم قياس جرعة الفنتانيل التي تم استهلاكها بعد العملية و علاقتها بالتعدد الجيني ، حيث تم تقسيم المرضى إلى ثلاثة مجموعات حسب التعدد الجيني لهم.

جميع المرضى تم تخديرهم تخديراً كلياً ، وتم اعطائهم جرعة الفنتانيل ١ ميك/كجم قبل انتهاء الجراح ب ٣٠ دقيقة عن طريق الوريد، و جميع المرضى تلقوا الفنتانيل عن طريق جهاز التحكم في المسكن بواسطة المريض .

تم متابعة المرضى خلال ٢٤ ساعة بعد العملية بواسطة ممرضة متخصصة و تسجيل التحكم في درجة الألم بعد تمام الأفافة عن طريق الفنتانيل كمسكن ، كما تم قياس درجة القيء و الغثيان او اي اعراض جانبية للفنتانيل ان وجد .

وقد وجدنا في دراستنا ان هناك علاقة بين التعدد الجيني لمستقبل مخدر الفنتانيل واستهلاكه كمس肯 بعد عمليات استئصال الرحم الكلي عن طريق البطن في المريضات المصريات، حيث وجدنا ان المرضى اصحاب التعدد الجيني (ج ج) اكثر استهلاكاً للفنتانيل من نظيرتها في المرضى اصحاب التعدد الجيني (ا ج) و (ا ا) .

كما و جدنا ايضا انه ليس هناك ارتباط بين استهلاك الفنتانيل والغثيان و القيء بعد العملية الجراحية.

الكلمات الدالة: الفنتانيل - التعدد الجيني - استئصال الرحم - مسكن - القيء - الغثيان- جهاز التحكم في المسكن بواسطة المريض.