

تأثير التأخر الزمني بين تشخيص الانصمام الرئوي التخثري المزمن وإجراء جراحة استئصال باطنة الشريان الرئوي في نتائج ما بعد إجراء الجراحة

الملخص العربي:

استئصال الخثاري الرئوي هو العلاج المفضل لارتفاع ضغط الدم الرئوي الخثاري المزمن في المرضى الذين يمكن إجراء جراحة لهم. قد ترتبط بعض عوامل الخطر بنتائج سيئة بعد هذه الجراحة .

التحقيق في تأثير التأخير في إجراء الجراحة على نتائج مختلفة.

في دراسة مستقبلية وبأثر رجعي، تم تسجيل ٢٠ مريضاً في دراستنا بين يونيو ٢٠١٩ وأبريل ٢٠٢١ .

كلما تأخرت الجراحة، ارتفع مقاومة الأوعية الدموية الرئوية بعد العملية الجراحية، والمرضى الذين تجاوزوا ١٣ شهراً منذ التشخيص المرضى الذين يعانون من خثرة رئوية طوروا بشكل كبير درجة وظيفية سيئة لعضلة القلب بعد العملية الجراحية، والمرضى الذين خضعوا لعملية جراحية بعد أكثر من ١٦ شهراً من تشخيص المرض طوروا بشكل كبير إصابة الرئة بعد الجراحة .

يرتبط تأخر استئصال الخثرة الرئوية بضعف الطبقة الوظيفية بعد العملية الجراحية، ودرجة أعلى من مقاومة الأوعية الدموية الرئوية والمزيد من حالات إصابة الرئة في إعادة التروية.