

نتائج الارتجاع الوظيفي المتوسط للصمام ثلاثي الشرفات باستخدام الغرز الجراحية لرأب حلقة الصمام النهج التحفظي للمرضى ثلاثي الشرفات بالمقارنة مع الخاضعين لاستبدال الصمام الميترالي

مقدمه: في هذه الدراسة تم بحث النتائج الأولية في المرضى الذين يعانون من ارتجاع متوسط بالصمام ثلاثي الشرفات الخاضعين لجراحة الصمام الميترالي و بعد عام من تاريخ العملية لتقييم ما إذا كان الإصلاح بواسطة الغرز الجراحية كان مصحوب بنتائج أفضل، ام كانت الطريقة التحفظية أفضل.

منهجه البحث: تم مراجعة الحالات، بشكل مستقبلي، التي خضعت لإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات بواسطة الغرز الجراحية (عدد ٣٤ حالة) مقابل الحالات التي تم استخدام الطريقة التحفظية معها (عدد ٣٤ حالة) بترك الصمام ثلاثي الشرفات بدون تدخل جراحي في حال إجراء جراحة للصمام الميترالي نتيجة للإصابة بحمي روماتيزمية، تم متابعة الحالات لمدة متوسطها ١٢ شهر.

نتيجة البحث : لم يكن هناك اي وفيات في المجموعتين و ذلك خلال ٣٠ يوما، درجة الارتجاع بالصمام ثلاثي الشرفات كانت أقل للمجموعتين بعد متابعة لمدة ١٢ شهر و ذلك بالموجات الصوتية على القلب بدون اي فرق إحصائي فارق. كما لم يكن هناك اي داعي لإعادة العملية لعلاج ارتجاع بالصمام ثلاثي الشرفات و ذلك للمجموعتين بانتهاء فترة المتابعة البالغة ١٢ شهر بعد العملية.

الخلاصه: وجد ان الطريقة التحفظية كانت مصحوبة بنتائج مرضية، مجموعة الحالات التي تم استخدام الغرز الجراحية بها لإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات أظهرت مؤشرات أولية أفضل من المجموعة التحفظية، و ذلك في المتابعة الأولية ما بعد العملية و أيضا في المتابعة على المدى الأطول.