

السمات الشعاعية لمرض الرئة الخلالي المصاحب لمرض الأوعية الدموية الكولاجينية في مستشفى جامعة الفيوم

الملخص :

الهدف: أمراض الأوعية الدموية الكولاجينية هي مجموعة متنوعة من الاضطرابات المناعية التي تؤثر على أعضاء متعددة، مثل إصابة النسيج الخلالي في شكل مرض الرئة الخلالي.

التصوير المقطعي المحوسب عالي الدقة هو حجر الأساس للتشخيص المناسب لمرض الرئة الخلالي.

الهدف: هدفت هذه الدراسة إلى دراسة السمات الإشعاعية لمرض الرئة الخلالي المرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية في مستشفى جامعة الفيوم.

التصميم: كانت هذه دراسة مقطعية.

المكان: أجريت الدراسة في مستشفى جامعة الفيوم في مصر خلال الفترة من يناير 2018 إلى يونيو 2018.

المرضى والطرق: شملت هذه الدراسة 100 مريض تم تشخيصهم بأمراض القلب والأوعية الدموية والذين تم إحالتهم من قسم الروماتيزم بمستشفى جامعة الفيوم يشكون من أعراض الصدر. لتشخيص هذه الحالات، كنا بحاجة إلى تاريخ طبي كامل وفحص سريري مفصل وقياس التنفس واختبار المشي لمدة 6 دقائق والتصوير المقطعي المحوسب عالي الدقة.

النتائج: كان النمط الشعاعي الأكثر أهمية لمرض القلب والأوعية الدموية الخلالي هو نمط الالتهاب الرئوي الخلالي غير المحدد، والذي يمثل 50% من الحالات، يليه نمط الالتهاب الرئوي الخلالي المعتاد، والذي يمثل 13% من الحالات.

الاستنتاج: الالتهاب الرئوي الخلالي غير المحدد هو النمط الشعاعي الأكثر شيوعًا بين مرضى أمراض القلب والأوعية الدموية في مستشفى جامعة الفيوم.

الكلمات المفتاحية: أمراض الأوعية الدموية الكولاجينية، مستشفى جامعة الفيوم، مرض الرئة الخلالي