

البحث الرابع

مسح غذائي بين الأطفال دون سن الخامسة في مركز طامية في الفيوم ، مصر

مقدمة:

يتسبب سوء التغذية في نصف وفيات الأطفال دون الخامسة كما هو الحال في العديد من البلدان النامية. في مصر ، يظل سوء التغذية قضية مهمة حيث أن 5.5٪ من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من نقص الوزن المرضي ، و 8.4٪ يعانون من الهزال و 21.4٪ يعانون من التقزم.

اهداف البحث:

أجريت هذه الدراسة لتقييم عوامل انتشار وسوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة الذين يسعون للحصول على المشورة الطبية في مرافق الرعاية الصحية بمركز طامية بالفيوم.

منهجية البحث:

شملت هذه الدراسة الوصفية المستعرضة 400 طفل دون سن الخامسة في مركز طامية بالفيوم. وقد تم تنفيذ هذه الدراسة على مدى 5 أشهر من يونيو إلى أكتوبر 2014. وقد خضع جميع المرضى لاستيفاء استبيان لقياس المتغيرات الديمغرافية ، والقياسات البشرية بما في ذلك الوزن والطول ومقارنته بمعايير منظمة الصحة العالمية .

النتائج:

ظهرت دراستنا أن 23.2 ٪ ، 18.5 ٪ و 19.3 ٪ من الأطفال كانوا يعانون من نقص الوزن ، التقزم والهزال ، على التوالي. كان التقزم أكثر شيوعاً في الإناث من الذكور. أيضاً ، تظهر نتائجنا أن عوامل اختطار سوء التغذية كانت 70.6 ٪ من الإصابة الطفيلية و 15.7 ٪ للإلتهاب المعوي مع ارتفاع معدلات الإصابة الطفيلية ، والعدوى الديدانية ، والتهاب المعدة والأمعاء بين الأطفال المهددين ، التقزم ، والأطفال ذوي الوزن القليل.

التوصيات:

ان معدل انتشار سوء التغذية مرتفعاً بين الأطفال دون الخامسة من العمر. تشير هذه النتائج إلى الحاجة إلى تنفيذ برنامج غذائي للتدخل في المستشفيات والمجتمع.

كلمات البحث :

سوء التغذية ، نقص الوزن ، الهزال ، التقزم ، الأطفال دون الخامسة