

الملخص العربي

التغير الوبائي لمرض قوباء الرأس (سعفة الرأس) بين أطفال المدارس في مصر

مقدمة:

تمثل سعفة الرأس مشكلة صحية منتشرة بين الأطفال في سن المدرسة.

أهداف البحث:

تقدير معدل انتشار سعفة الرأس بين طلاب المدارس الابتدائية، في الفيوم، مصر مع تحديد العوامل المسببة في كل من المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة.

طرق البحث:

أجريت دراسة وصفية مستعرضة في اثنتي عشرة مدرسة ابتدائية. وقد تم اختيار الطلاب من مختلف السنوات الدراسية بإجمالي عدد ١٢١٢٨ طالب وطالبة. تم إجراء فحص سريري للشعر وفروة وأخذت عينات الفطريات للفحص المجهرية.

النتائج:

كان انتشار سعفة الرأس في مجموعة الدراسة بنسبة ٠.٤٪ وأعلى في المدارس العامة عن المدارس الخاصة (٧٣.٥٪ مقابل ٢٦.٥٪ على التوالي). والأولاد أكثر تأثراً من الفتيات بنسبة ٥:١ الأولاد إلى نسبة الفتيات. كان نسبة وجود العدوي داخل الأسرة حوالي ٤٠.٨٪ بينما أظهرت ٥١٪ الي. تدني المستوي الاجتماعي.

الاستنتاجات:

ظهور نوع اخر غير منتشر كمسبب جديد لسعفة الرأس في مصر بالرغم من انخفاض معدل الانتشار أقل مما ذكر سابقا.

كلمات الدالة للبحث:

سعفة الرأس. علم الأوبئة. طلاب المدرسة.