

# دراسة تأثير لقاح الكوفيد ١٩ على الأداء الجنسي للسيدات

فرضية

المقدمة للتعبة الجزئية لـ

درجة الماجستير في الأمراض الجلدية والأمراض التناسلية

بواسطة

هايدي عبد السميع عبد المنعم عبد السميع

M.B.B.CH

قسم الأمراض الجلدية والأمراض التناسلية

كلية الطب

جامعة الفيوم

٢٠٢٣

# دراسة تأثير لقاح الكوفيد ١٩ على الأداء الجنسي للسيدات

فرضية

المقدمة للتعبة الجزئية لـ

درجة الماجستير في الأمراض الجلدية والأمراض التناسلية

بواسطة

**هايدي عبد السميع عبد المنعم عبد السميع**

تحت اشراف

**د/ نهى عزت محمد عبد الجواد**

استاذ مساعد الامراض الجلدية والتناسلية والذكورة

كلية الطب-جامعة الفيوم

**د/اسماء يونس السيد عبد السلام**

استاذ مساعد الامراض الجلدية والتناسلية

كلية الطب- جامعة القاهرة

**د/اسماء محمد مختار محمد**

مدرس الامراض الجلدية والتناسلية والذكورة

كلية الطب-جامعة الفيوم

كلية الطب

جامعة الفيوم

٢٠٢٣

# الملخص العربي

## الملخص العربي

منذ ديسمبر 2019 ، تم اكتشاف الفيروس التاجي الجديد لأول مرة ، وساهمت قدرة انتقال العدوى العالية في وباء فيروس كورونا العالمي (COVID-19) في عام 2020

يهدف لقاح كوفيد-19 إلى توفير المناعة المكتسبة ضد فيروس كوفيد-19 و هو فيروس تنفسي ينتقل عن طريق القطرات التنفسية والاتصال المباشر مع الإفرازات المصابة.

حتى 1 يونيو 2020، كان هناك 124 لقاحا مرشحا يجري تطويرها للوقاية من COVID-19 من هذه اللقاحات، دخل 10 لقاحات مرشحه المرحلة 1، المرحلة المشتركة 2/1 أو المرحلة 2 للتجارب السريرية البشرية في البالغين.

وبالتوازي مع القيود المفروضة لمنع انتشار الفيروس واختبار العلاجات المضادة للفيروسات يجري التطوير المتسارع للقاحات لتقييد الأضرار الفيروسية المحتملة.

تؤكد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن لقاحات كوفيد-19 المعتمدة آمنة وموصى بها ، بما في ذلك الأشخاص الذين يخططون لممارسة الجنس و / أو الحمل. من غير المعروف أن اللقاحات تؤثر بشكل خاص على الرغبة الجنسية وأي تأثيرات غير مباشرة على الرغبة الجنسية يجب أن تكون مؤقتة فقط.

### هدف العمل:

تقييم تأثير اللقاحات المختلفة المضادة COVID-19 على الأداء الجنسي للسيدات لفيروس

- كانت هناك درجة منخفضة في الرغبة الجنسية، والإثارة، والنشوة الجنسية و الرضا و درجة الوظيفة الجنسيه الاجمالية بالأضافة الى ارتفاع متوسط الألم بين المجموعة الملقحة.

- وجدنا أن 69.3% من المجموعة الملقحة تعاني من الاعتلال الجنسي الوظيفي . وفيما يتعلق بدرجة الاعتلال الوظيفي فإن 24.9% بدرجة خفيفة، و 44.2% بدرجة خفيفة إلى متوسطة، و 12.4% بدرجة متوسطة، و 1.1% بدرجة شديدة.

- كانت هناك نسبة أعلى من الاعتلال الجنسي الوظيفي بين النساء اللاتي تلقين لقاح كوفيد-19، وخاصة سينوفارم وأسترازينيكا.

- كانت هناك نسبة أعلى من الاعتلال الجنسي الوظيفي ذو الدرجة المتوسطة بين النساء اللاتي تلقين لقاح كوفيد-19، وخاصة نوع سينوفارم، و نسبة أعلى من الاعتلال الجنسي الوظيفي ذو الدرجة الشديدة بين الحالات التي تلقت لقاح أسترازينيكا.

- كان هناك ارتباط إيجابي ذو دلالة إحصائية بين الإثارة، والنشوة الجنسية، والرضا، مع العمر وعمر الزواج ومدة الزواج. وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك ارتباط سلبي ذو دلالة إحصائية بين الإثارة، والنشوة الجنسية، مع فارق العمر بين الزوجين