

6-انتشار وسمات الصدفية بين عينة من طلاب المدارس الاعداديه فى الريف المصرى : دراسته استكشافية

الخلفية والأهداف:

يُظهر انتشار الصدفية تباينًا جغرافيًا عالميًا يتراوح من 0 إلى 11.8%. هذا يعكس حقيقة أن الصدفية مرض معقد يتأثر بالعوامل الوراثية والبيئية. معدل انتشار الصدفية لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا تم تسجيله 0.40% ؛ ومع ذلك ، فإن البيانات المتعلقة بانتشارها الحقيقي بين الأطفال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط قليلة جدا ، خاصة بين الفئات العمرية الأصغر سنًا التي تعيش في المناطق الريفية. تم تنفيذ هذا العمل لاستكشاف انتشار وخصائص الصدفية بين عينة من طلاب المدارس الاعداديه فى مجتمع ريفي فى الفيوم، بمصر .

المرضى والطريقة: شملت هذه الدراسة المستعرضة 3061 طلاب المدارس الاعداديه الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عامًا من خمس مدارس تحضيرية عامة فى فايوم ، منطقة سينوريس الريفية. تم جمع البيانات الديموغرافية والمتعلقة بالأمراض من خلال ورقة استبيان بمساعدة ذاتيا. تم إجراء الفحص السريري لجميع المجندين ، وتم تسجيل بيانات المرض للمرضى الذين يعانون من الصدفية ، بما فى ذلك مدى شدة المرض وشدة الصدفية باستخدام منطقة الصدفية ودرجة مؤشر الشده

النتائج :

كان معدل انتشار الصدفية 0.1% بين جميع الطلاب الذين تم فحصهم فى الدراسة ، مع النسبة من الإناث إلى الذكور 3 إلى 1. كان العامل الأكثر أهمية هو التغيرات فى المواسم والمناخ ، حيث ساء 50% من المرضى فى فصل الشتاء

الخلاصه:

. كان مدى وشدة الصدفية بين الأطفال المصابين خفيفه . كان الانتشار والخلفية الجينية للصدفية منخفض مع وجود أشكال خفيفه من الصدفية ا بين طلاب المدارس الاعداديه فى الريف بالفيوم ، منطقة سنورس.

تاريخ قبول النشر: فبراير 2022