قسم الأشعة التشخيصية

بطاقة تسجيل البحث الخامس

- عنوان البحث:
- The ultrasound of subcutaneous extrapelvic endometriosis

الموجات فوق الصوتية لبطانة الرحم المهاجرة خارج الحوض وتحت الجلد •

• أسماء الباحثين وأدوارهم:

التوقيع	دور الباحث	الكلية	التخصص	الاسم
	فكرة البحث- جمع المادة العلمية- تقييم الحالات – متابعة إجراء الأشعات و كتابة تقاريرها و استخلاص النتائج – كتابة البحث و متابعة النشر	طب الفيوم	الأشعة التشخيصية	اشرف طلعت يوسف حسين

• ملحوظات: بحث منفرد دولي منشور

• مكان إجراء البحث: مستشفى الفيوم الجامعي

• مكان نشر البحث : Journal of Ultrasonography

• تاريخ النشر مجلة التصوير بالموجات فوق الصوتية المجلد ٢٠،٠٠،

البحث الخامس:- الموجات فوق الصوتية لبطانة الرحم المهاجرة خارج البحث الخامس:- الحوض وتحت الجلد

ملخص البحث :-

الْحُلْفِية: يعد وجود بطانه الرحم الوظيفية والسدى في أي مكان باستثناء بطانة تجويف الرحم بمثابة انتباذ بطانة الرحم.

الانتباذ البطاني الرحمي خارج الحوض الذي يشمل ندبة العملية القيصرية لجدار البطن غير شائع ونادرًا ما يصيب منطقة العجان والسرة وغشاء البطن والكلى والرئتين والكبد.

الأهداف: الغرض من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على المواقع النادرة خارج الرحم ، وشرح التسبب في الانتباذ البطاني الرحمي خارج الحوض ، وتقييم الأهمية التشخيصية للنتائج السريرية ، ومستوى مصل 125 CA والموجات فوق الصوتية.

المواد والطرق: ٢٤ مريضة يعانين من اورام بطانة الرحم التي استند فيها التشخيص النهائي إلى النتائج الجراحية والتقارير النسيجية المرضية للعينات المستأصلة. خضع المرضى للفحص الاكلينيكي وفحص بالموجات فوق الصوتية ، وتقييم مستوى المصل 125 CA. تم فحصهم أيضا من قبل الموجات فوق الصوتية عبر المهبل لاستبعاد الانتباذ البطاني الرحمي أو العضال الغددي الرحمي. قد كانوا خضعوا كذلك للموجات فوق الصوتية لجدار البطن في حالات ندبة العملية القيصرية أو تورمات المنطقة السرية ، والموجات فوق الصوتية عبر العجان وكذلك الموجات فوق الصوتية عبر المهبل تم إجراؤهم في المرضى الذين يعانون من ورم بطانة الرحم العجان لتقييم العلاقة بين الآفة والعضلة العاصرة الشرجية الخارجية.

النتائج: في ١٩ مريضا ، تم الكشف عن ورم بطانة الرحم ندبة عملية قيصرية جدار البطن. كان لدى ثلاثة مرضى أورام بطانة الرحم حول الشرج ، واثنان من المرضي كان لديهم ورم بطانة الرحم السري.

الخلاصة: كان الفحص بالموجات فوق الصوتية أداة تشخيصية مفيدة لتقييم الانتباذ البطاني الرحمي خارج الحوض وامتداده ، خاصة في الحالات التي لا تتضمن المظاهر السريرية النموذجية التي يمكن أن توحي بورم بطانة الرحم ، حساسية تشخيصية منخفضة في مصل الدم CA 125 ، وانخفاض معدل الإصابة بالأمراض المصاحبة داخل الحوض.