

عنوان البحث باللغة الانجليزية:

Prevalence of Obesity in children with unexplained dizziness: A cross-sectional study

عنوان البحث باللغة العربية:

انتشار السمنة لدى الاطفال الذين يعانون من دوام غير مبرر: دراسه مقطعيه

اسماء المشاركين في البحث:

- 1-أ.د./حسام عبد الغفار استاذ امراض السمع والاتزان - كلية الطب -جامعة حلوان
- 2-أ.د./شريف صفوت جندى استاذ الانف والاذن والحنجرة - كلية الطب -جامعة الفيوم
- 3-د/ محمود محمد مجدى مدرس امراض السمع والاتزان -كلية الطب -جامعة الفيوم
- 4-أ م /ريهام رفيع الشافعى - استاذ مساعد امراض السمع والاتزان - كلية الطب -جامعة الفيوم
- 5-منى احمد العقاد مدرس امراض السمع والاتزان - كلية الطب -جامعة الفيوم

FUMJ, Volume 11, issue 1, Pages 38-48, 2023

مكان وتاريخ النشر

الملخص

تعد مصر من الدول التي تواجه مشكلة صحية تتعلق بالسمنة وزيادة الوزن. سابقاًشارت الدراسات إلى أن سمنة الأطفال هي قضية صحية عامة مهمة في مصر. الدوخة هيالشكوى السائدة بين عامة السكان؛ علاوة على ذلك، فهي حالة شائعة عند الأطفال. دوخةينشأ من أمراض دهليزية وغير دهليزية مختلفة؛ ومع ذلك، ظل بعض المرضى غير معروفينمن حيث مسببات الدوخةالهدف من الدراسة: هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مدى انتشار السمنة لدى الأطفال الذين يعانون من دوخة مفسرة وغير مفسرة من أجل شرح مسببات الدوخة لديهم.الموضوعات والطرق: تم تضمين ما مجموعه 150 طفلاً يشكون من الدوام في هذه الدراسة المقطعية. خضع جميع المشاركين لتقييم سمعي ودهليزي كامل. تم حساب مؤشر كتلة الجسم (BMI) وفقاً لقياسات الجسم البشري.النتائج: كشفت العلاقة بين التشخيص النهائي الذي تم التوصل إليه لشرح الدوخة لدى الأطفال العاديين والبدناء أن 4.9% فقط من ذوي الوزن الطبيعي يعانون من دوام غير مبرر، مقارنة بـ 90.9% من المشاركين البدناء الذين يعانون من دوام غير مبرر. الاستنتاجات: الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة أظهروا دوخة غير مبررة بشكل متكرر أكثر من الأطفال ذوي الوزن الطبيعي. لذلك كان فحص مؤشر كتلة الجسم مطلوباً في جميع الأطفال الذين يعانون من الدوخة. يجب إضافة تصوير الجهاز البولي الديناميكي إلى التقييم القياسي للأطفال المصابين بالدوام.

القائم باعمال عميد الكلية

أ.د نجلاء

أ.د شريف جندى

الشريبيني