

الملخص العربي

إن سرعة القذف من أكثر الأنواع شيوعا في المشاكل الجنسية حيث يقذف الرجل قبل ان يحقق شريكة النشوة الجنسية.

الهدف من رسالتنا هو تحليل حجر السعادة وتطبيقه على المتردين على العيادة الخارجية للمستشفى الجامعي محافظة الفيوم من ٢٠١١|٣|١م إلى ٢٠١١|١٢|٣١م

وتتكون دراستنا من جزأين:

١-أجري الجزء الأول من هذه الدراسة في وحدة الطب الشرعي و السموم - كلية الطب- جامعة الفيوم. في هذا العمل قمنا بتحليل عينات من حجر السعادة للكشف عن تكوينها
٢- وأجري الجزء الثاني من الدراسة في العيادة الخارجية للأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة- مستشفى جامعة الفيوم. و أجريت الدراسة على مدى ١٢ أسبوع على ٣٠ مريضا من الذكور بعد معرفتهم بالدراسة وموافقهم وتراوحت أعمارا لمرضى الذين أجريت عليهم الدراسة ما بين ٢٨ و ٥٢ عاما. وقد تم اختيار المرضى الذكور من المتردين على العيادة الخارجية الذين يشكون من سرعة القذف
وفي الجزء الأول لتحديد مكونات حجر السعادة :

أجريت بعض التفاعلات الكيميائية للكشف إذا كان عينة من حجر السعادة تحتوي على مركب النيتريت أم لا ولوحظ أن عينات حجر السعادة أعطت نتيجة ايجابية في التفاعلات الكيميائية وتأكد احتوائه على مركب النترت .
- كما تم الكشف على احتوائه على الكادميوم وتركيزه ١٠٠ملي جرام /جرام مع وجود مادة صمغية عن طريق جهاز التلسكوب الماص الذري .

ومن ذلك يتضح أن التركيب الأساسي لحجر السعادة هو نيتريت الكادميوم .
وبمقارنة الأبحاث السابقة التي أثبتت أن حجر السعادة يحتوي على نترات او نترات مع معدن الفضة أو الرصاص أو زرنخ مع دراستنا فإننا نستنتج أن حجر السعادة منتج عشبي يحتوي على نترات أو نيتريت مع وجود معدن يختلف نوع هذا المعدن حسب نوع التربة وتغذيتها من المعادن ومكان نمو الشجرة .

ويحتوي الجزء الثاني على :-

١ - تاريخ طبي كامل بما في ذلك: التاريخ الطبي العام (السكر والضغط وأمراض الكبد والكلية، وأمراض القلب، وأية اضطرابات عصبية).

٢ - التاريخ الجنسي: مثل

- أ. استبعاد الضعف الجنسي .
- ب. مدة المكوث في المهبل قبل القذف .
- ج. بداية ومدة سرعة القذف .
- د. تاريخ العلاقات الجنسية.

٣. التاريخ النفسي: مثل

- أ. الاكتئاب .
- ب. الملل والضيق .

٤. الفحص: أ. فحص عام .

- ب. فحص (القضيب، الخصية) .
- ج. فحص المستقيم
- د. فحص الأطراف السفلية والحوض .

٥. الفحوصات :

- أ. تحليل البول .

- ب. عينة من البروستاتا اذا كان التهابها متوقع .

واظهر التاريخ الطبي الكامل أن ٢٦.٧٪ كانوا مرضى السكري ، و ٤٠٪ كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، و ١٠٪ كانوا مرضى الكلى، و ٢٣.٣٪ كانوا مرضى الكبد، و ١٣.٣٪ كانوا يعانون من أمراض القلب، في حين لا يعاني اي من المرضى إضرابات عصبية.

واظهر التاريخ الجنسي أن ٢٦.٧٪ من المرضى كان لهم لعلاقات جنسية سابقة . وكان ١٦.٧٪ من المرضى يمارسون العادة السرية في وقت مبكر خلال حياتهن الجنسية ، مع ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج. ولا يوجد إشباع جنسي لدى جميع المرضى في حين ٩٣.٣٪ من الزوجات لا يوجد لديهم إشباع جنسي .

وباستخدام المرضى لحجر السعادة لوحظ ارتفاع تدريجي في مدة المكوث في المهبل قبل القذف من متوسط ١،٤٨ دقيقة إلى ٢١.٤ دقيقة بعد ٢ أسابيع إلى ٢٧.٤ دقيقة بعد ٤ أسابيع إلى ٣٣.٣٣ دقيقة بعد ٨ أسابيع، وأخيرا إلى ٤١.٩٧ دقيقة بعد ١٢ أسبوعا. ولم يلاحظ أي آثار جانبية خلال فترة الدراسة.