



جامعة الفيوم
كلية الطب البشرى
قسم الأمراض الباطنة



ملخص بحث (البحث الثاني)

عنوان البحث: استعداد مرضى غسيل الكلى المصريين لتلقي الجرعة المعززة من لقاح كوفيد-19: دراسة استقصائية متعددة المراكز

الملخص العربى

الخلفية: واجهت السلطات الصحية صعوبة في زيادة الإقبال على التطعيم منذ توفر لقاحات كوفيد-19. ومع ذلك، تزايدت المخاوف بشأن انخفاض المناعة بعد جرعة التطعيم الأولى ضد كوفيد-19 مع ظهور سلالات جديدة. وقد طبقت جرعات معززة كسياسة تكميلية لزيادة الحماية من كوفيد-19. وقد أبدى مرضى غسيل الكلى المصريون تردداً كبيراً في تلقي جرعة التطعيم الأولى ضد كوفيد-19، إلا أن استعدادهم لتلقي الجرعات المعززة غير معروف.

الهدف: هدفت هذه الدراسة إلى تقييم تردد مرضى غسيل الكلى المصريين في تلقي الجرعة المعززة من لقاح كوفيد-19 والعوامل المرتبطة به.

الطرق: أجريت مقابلات شخصية باستخدام استبيانات مغلقة وزعت بواسطة العاملين في مجال الرعاية الصحية في سبعة مراكز غسيل كلى مصرية، تقع بشكل رئيسي في ثلاث محافظات مصرية، بين 7 مارس و 7 أبريل 2022.

النتائج: من بين 691 مريض غسيل كلى مزمناً، أبدى 49.3% ($E = 341$) استعدادهم لتلقي الجرعة المعززة. كان السبب الرئيسي للتردد في تلقي الجرعة المعززة هو الاعتقاد بأن الجرعة المعززة غير ضرورية ($E = 83$ ، 44.9%). وارتبط التردد في تلقي الجرعة المعززة بالجنس الأنثوي، وصغر السن، والعزاب، والإقامة في الإسكندرية والمدينة، واستخدام قسطة غسيل الكلى النفقية، وعدم التطعيم الكامل ضد كوفيد-19. وكانت احتمالات التردد في تلقي الجرعة المعززة أعلى بين المشاركين الذين لم يتلقوا لقاح كوفيد-19 الكامل، وبين أولئك الذين لم يخططوا لتلقي لقاح الإنفلونزا (10.8 و 4.2 على التوالي).

الاستنتاج: يمثل التردد في تلقي الجرعة المعززة لكوفيد-19 بين مرضى غسيل الكلى في مصر مصدر قلق كبير، ويؤكد على ضرورة وضع استراتيجيات فعالة لزيادة الإقبال على اللقاح.

الكلمات المفتاحية: لقاح كوفيد-19، الجرعة المعززة، التردد تجاه اللقاح، فيروس SARS-CoV-2، الغسيل الكلوي الدموي

عميد الكلية
أ.د نجلاء الشربيني

رئيس مجلس القسم
أ.د محمد عبد الهادى مشاحيت