



كلية الطب



جامعة الفيوم  
Fayoum University

7. البحث السابع: بحث جماعي منشور

**Timing and Outcome Concerns regarding  
Feminizing Genitoplasty from the Perspective  
of Egyptian Families of Girls with Virilized  
External Genitalia**

التوقيت والنتائج بشأن تجميل الاعضاء التناسلية من وجهة نظر  
الأسر المصرية للبنات التي تعاني من زيادة هرمون الذكورة في الأعضاء التناسلية الخارجية

الملخص العربي:

خلفية:

تضخم الغدة الكظرية الخلقي في الإناث يؤدي إلى تذكير في الأعضاء التناسلية الخارجية والجيب التناسلي المستمر. هناك جدل حول توقيت ونتائج الجراحة. إن تأجيل العمليات الجراحية خارج مرحلة الطفولة أمر صعب التنفيذ في المجتمعات المحافظة، وقد يؤدي إلى الوصم والضييق للأفراد الذين يعانون من اضطرابات في التمايز الجنسي وأسرهـم.

أساليب:

تم قبول ثلاثين فتاة تعاني من تذكير في الأعضاء التناسلية الخارجية بسبب تضخم الغدة الكظرية الخلقي لمرحلة واحدة من الجنين المؤنث، بين عامي ٢٠١١ و ٢٠١٤. ودرسنا على نحو مستقبلي مخاوف وإسهامات الأسر التي تمثلها الأمهات. وبعد تقديم المشورة الشاملة، استكملت الأمهات استبياننا لتوضيح أولوياتهن وشواغلهن المتعلقة بالجراحة.

النتائج:

أجريت العمليات الجراحية في عمر متوسط من ٢٢ شهرا. وتراوحت معظم الحالات بين درجتي برادر الثالث والرابع. وتعتقد الأسر المصرية أن إعادة الإعمار الجراحي في وقت مبكر هو في مصلحة بناتهم. هم أكثر قلقا بشكل هامشي حول النتائج الوظيفية وحمل الطفل في المستقبل من المظهر الخارجي والنتائج التجميلية.

الاستنتاجات:

الصعوبات الاجتماعية تضيف بشكل ملحوظ تحديات لخطة الإدارة داخل المجتمعات المحافظة ان الجراحة التناسلية المبكرة، عندما تكون وصى باستعمالها، يجب أن تبقى خيارا قابلا للتطبيق. وهناك حاجة إلى دعم نفسي اجتماعي شامل ضمن نهج متعدد التخصصات لإرجاء تجميل الأعضاء التناسلية في حالات مختارة إلى مرحلة المراهقة.