



كلية الطب



جامعة الفيوم  
Fayoum University

## البحث الاول

علاج الأورام الوعائية الدموية في الرقبة والوجه

### **الملخص العربي:**

الخلفية: الأورام الوعائية هي الأورام الحميدة من الطفولة والطفولة، وتتميز النمو السريع للخلايا البطانية، تليها لاحقة بطيئة الانقلاب. ورم وعائي هو ورم الأكثر شيوعا من مرحلة الطفولة ويحدث في 4-10% من الرضع البيض. العلاج هو في الأساس متوقع ينتظر ثورة عفوية. ولكن في بعض الحالات السريرية يشار التدخل المبكر. الغرض: أجريت هذه الدراسة لتقييم نتائج طرائق العلاج المختلفة لعلاج ورم وعائي عنق الرحم. الأساليب: على مدى فترة 5 سنوات، تم علاج 38 ورم وعائي عنق الرحم في 38 الرضع باستخدام المنشطات (النظامية وداخل الحدود)، نبض صبغة الليزر، والاستئصال الجراحي. النتائج: بلغ متوسط عمر بدء العلاج 14.89 شهرا. وكان العرض الرئيسي هو التشوه (71.1%) وكانت المضاعفات الرئيسية النزيف والتقرح (31.6%). (تلقي عشرين مريضا المنشطات داخل الأمعاء (بيتاميثازون فوسفات الصوديوم 2 ملغ / مل، بيتاميثازون ديبروبيريونات 5 mg / مل، وأسيونيد تريامسينولون 40 ملغ / مل) بين 2-4 حقن، مع حجم الجرعة حقن فردية وفقا لحجم الآفة. تلقي 11 مريضا المنشطات النظامية (3-4 ملغ / كغ برينديزون عن طريق الفم يوميا لكل دورة من 2-3 أشهر، مع تكرار ممكن من دورة. (وكان ثمانية عشر مريضا جلسات ليزر صبغ نابض (بدل) بالتزامن مع طريقة أخرى من العلاج: 16 مريضا كان شكل من أشكال الاستئصال الجراحي. كان متوسط مساحة الأورام الوعائية المعالجة  $14.47 \pm 3.04$  سم<sup>2</sup>. وكانت فترة المتابعة المتوسطة 13.76 شهرا. وعموما، كان 73.68% من الحالات (28 مريضا) حل كامل للآفة أو تحسن كبير. وكانت أفضل النتائج التي تحققت لأفات أصغر عرضة للمنشطات داخل الإختام، استئصال الجراحي، أو كليهما. أسوأ النتائج (معتدلة أو الحد الأدنى من التحسين) واجهت مع آفات أكبر، في المرضى الذين يتلقون المنشطات الجهازية ± العلاج بالليزر. وبشكل عام، كان من الممكن تحقيق حل كامل أو تحسن كبير مع آفات أصغر (متوسط مساحة 9،42 سم<sup>2</sup>) مقارنة مع الحد الأدنى من التحسن في الأورام الوعائية مع متوسط مساحة 28.6 سم<sup>2</sup> (ع = 0.004). الاستنتاج: هناك عدد من الخيارات العلاجية المتاحة لعلاج الأورام الوعائية والقرار السريري بشأن أي العلاج أو مجموعة من العلاجات للاستخدام يتم على أساس فردي. يتم تحقيق نتائج أفضل مع الآفات الصغيرة. كلمات البحث: هيمانجيوما، العلاج كورتيكوستيرويد داخل الحدود، نابض صبغ الليزر.