

البحث السابع

عنوان البحث

Two-stage Buccal mucosal graft urethroplasty

راب الاحليل برقة مخاطية الشدق على مرحلتين

اسماء المؤلفين:

الترتيب	دوره	المؤلف
	فكرة البحث + جمع البيانات + كتابة المقال	احمد فارس
	فكرة البحث + جمع البيانات + كتابة المقال	عمرو عبد المنعم محمد النجاري
.		

مكان النشر : المجله المصريه لجراحه التجميل والاصلاح

تاريخ النشر: قبول النشر فبراير ٢٠١٢

الملخص العربي:

تمت الدراسة بكلية الطب جامعة القاهرة ما بين يناير ٢٠٠٦ الى يونيو ٢٠١١ على عشرة مرضى يعانون من عيب خلقي بفتحة مجرى البول ولقد اجريت لهم عملية راب الاحليل برقة مخاطية الشدق على مرحلتين

ولقد ثبتت الدراسة إن استخدام الرقعة مخاطية الشدق كان اختيار امثل في مثل هذه الحالات حيث انه يخلق بديلاً جيداً لمجرى البول كذلك اثبت ان السليه والغلافة الغمدية يقدمان الحاجز الام الذي يقلل من حدوث التنسور ولم يحدث ضيق او رتج بمجرى البول الجديد.

عميد الكلية

ا.د / اشرف حسين محمود

رئيس القسم

ا.د / ايمن العيسوي