



تقييم قصير المدى للنتائج التجميلية لتحريك انسجة الثدي في سرطان الثدي

رسالة

توطئة للحصول علي درجة الماجستير في الجراحة

مقدمة من

ماجد حسين محمود علي

طبيب مقيم الجراحة

تحت اشراف

الأستاذ الدكتور / محمد ابراهيم عبد العزيز محمد

أستاذ الجراحة

كلية الطب - جامعة الفيوم

الدكتور / ايمن محمود عبدالحميد عبدالقادر

مدرس الجراحة

كلية الطب - جامعة الفيوم

الدكتور / محمد مصطفى محمد فرج

مدرس الجراحة

كلية الطب - جامعة الفيوم

كلية الطب

جامعة الفيوم

2023

الملخص العربي

لقد تطور العلاج الجراحي لسرطان الثدي بشكل ملحوظ على مر السنين، حيث اتجه بعيداً عن الإجراءات الجذرية، واتجه نحو تلك التي يتم فيها الاستئصال الكامل للورم مع الحفاظ على الأنسجة الحمة الطبيعية وبالتالي تقليل معدلات الإصابة بالأمراض لدى المريضة. وقد سمح هذا التحول بتحسين النتائج الجمالية ونوعية الحياة للمرضى، مع الحفاظ على السلامة المكافئة للأورام.

تهدف الدراسة الحالية إلى تقييم النتائج الجمالية المبكرة لسرطان الثدي ذو الأرباع الأربعة باستخدام السديلة الدورانية المتني. ولتحقيق هذا الهدف، تم تضمين 20 مريضة مصابة بسرطان الثدي وتم علاجهن جراحياً بتقنيات الأورام السرطانية ذات الإزاحة الحجمية (السديلة الدورانية الغدية الجلدية المصفوفة) في مستشفيات جامعة الفيوم.

ومن خلال الدراسة الحالية يمكننا تلخيص ما يلي:

- كان متوسط عمر المرضى الذين شملتهم الدراسة 48.35 ± 8.32 عاماً بمتوسط عمر 49.50 عاماً يتراوح بين 36 و 63 عاماً. من بين المرضى الذين شملتهم الدراسة، تلقى 6 (30.0%) من المرضى العلاج المساعد الجديد.
- فيما يتعلق بموقع الورم في المرضى الذين شملتهم الدراسة، تم الإبلاغ عن أورام الربع العلوي الخارجي في 13 (65.0%) من المرضى، وتم الإبلاغ عن ورم الربع الداخلي العلوي في 3 (15.0%) من المرضى، وتم الإبلاغ عن ورم الربع الخارجي السفلي في 2 (10.0%) من المرضى. تم الإبلاغ عن أورام الربع الخارجي في 15 (75.0%) من المرضى، وتم الإبلاغ عن أورام الربع الداخلي في 5 (25.0%) من المرضى.
- كان متوسط قطر الورم الأكبر في المرضى الذين تمت دراستهم 2.93 ± 0.77 سم مع متوسط أكبر قطر للورم 3 سم يتراوح بين 2 و 4 سم.
- كان متوسط عدد العقد الليمفاوية الإيجابية في المرضى الذين شملتهم الدراسة 1.25 ± 0.91 مع متوسط عدد عقدة ليمفاوية واحدة يتراوح بين 0 و 3 عقد ليمفاوية. كان متوسط عدد العقد الليمفاوية الكلية في المرضى الذين شملتهم الدراسة 16.30 ± 3.34 مع متوسط عدد 17 عقدة ليمفاوية يتراوح بين 11 و 23 عقدة ليمفاوية.
- فيما يتعلق بتصنيف الكلية الأمريكية للأشعة لكثافة الثدي، تم تصنيف 2 (10.0%) من المرضى على أنهم فئة أ، وتم تصنيف 7 مرضى (35.0%) على أنهم فئة ب، وتم تصنيف 7 مرضى (35.0%) على أنهم فئة ج، و 4 (20.0%) تم تصنيف المرضى على أنهم فئة د. تم الإبلاغ عن a + d في 6 (30.0%) من المرضى وتم الإبلاغ عن b + c في 14 (70.0%) من المرضى.
- تم الإبلاغ عن أن النتائج الجمالية كانت ممتازة في 2 (10.0%) من المرضى، وجيدة في 12 (60.0%) مريضاً، وعادلة في 5 (25.0%) من المرضى، وضعيفة في مريض واحد (5.0%). كانت المضاعفات الوحيدة المبلغ عنها هي الكدمة التي تم الإبلاغ عنها في مريض واحد (5%).
- كان للمرضى الذين يعانون من كثافة الثدي b + c نتائج جمالية أفضل بكثير بالمقارنة مع المرضى الذين يعانون من كثافة الثدي a + d.
- كان للمرضى الذين يعانون من أورام الربع الخارجي نتائج جمالية أفضل بكثير بالمقارنة مع المرضى الذين يعانون من أورام الربع الداخلي.

خلاصة القول، إن 70% من مرضى سرطان الثدي الذين خضعوا لجراحة الأورام باستخدام السديلة الدورانية المتني كانت نتائجهم جيدة إلى ممتازة مع حدوث مضاعفات بنسبة 5% فقط. تؤثر الكثافة الغدية وموقع الورم بشكل كبير على النتائج الجمالية للمرضى المصابين بسرطان الثدي الذين خضعوا للسديلة الدورانية المتني.