المقارنة بين اجراء عملية الفتق الاربي في الأطفال بين طريقة الفتح المعتادة، والاصلاح باستخدام المنظار الجراحي مع اجراء اختبار الضغط، دراسة مقارنة مستقبلية

## ملخص الرسالة

في هذه الدراسة تم مقارنة الطريقه التقليديه لاصلاح الفتق الاربي في الاطفال بطريقه المنظار الجراحي مع عمل اختبار الضغط. وتمت المقارنه بالنسبه لنسب الارتجاع بشكل خاص ، حيث ان الاصلاح بطريقة المنظار الجراحي مصحوبة بنسب ارتجاع اعلى كما هو مذكور في كل الدراسات السابقة وكذلك المقارنة للمميزات والعيوب الاخرى التي اتضحت اثناء اجراء البحث اشتمل هذا البحث على واحد وتسعون طفلا مابين سن ثلاثة اشهر الى احدى عشرة سنة . تم تقسيم الاطفال الى مجموعتين متساويتين مجموعة لكل طريقه وتمت مقارنة النتائج احصائيا. بعد البحث تشير النتائج انه توجد فروق احصائيه جوهريه بين الطريقه التقليديه لربط القناه الاربيه وطريقة المنظار الجراحي، حيث كان هناك نسب ارتجاع عالية ..والجدير بالذكر ان كل حالات الارتجاع كانت في بداية الدراسة ولم يحدث اي ارتجاع بعد ذلك نتيجة تغيير طريقة الاصلاح وتغيير نوعية الخيط المستخدم. نستنتج من هذه الدراسه ان اجراء عملية الفتق الاربي في الاطفال بواسطة المنظار الجراحي طريقه مناسبه لاصلاح الفتق الاربي وبالرغم من النسبة العالية في الارتجاع الا انه باتخاذ الاحتياطات المذكورة في طيات هذا البحث يمكننا الوصول الى نفس نسب الارتجاع المتعارف عليها في الطريقة النقليدية للفتح الجراحي.