

التغيرات الحجمية قصيرة المدى للمعدة بعد عملية تكميم المعدة بالمنظار

رسالة مقدمة من

طبيب/سامح محمد سمير

توطئة للحصول على درجة الدكتوراة فى الجراحة العامة

تحت اشراف

الاستاذ الدكتور/ايمن محمود فوزى عيسوى

استاذ الجراحة العامة وجراحة المناظير. كلية الطب. جامعة الفيوم

الدكتور / نادر زكى شعبان

استاذ الجراحة العامة وجراحة المناظير. كلية الطب. جامعة الفيوم

الدكتورة / غادة مرشد احمد

استاذ الجراحة العامة وجراحة المناظير . كلية الطب. جامعة الفيوم

الدكتور/ اشرف طلعت حسين

استاذ مساعد الاشعة التشخيصية. كلية الطب. جامعة الفيوم

كلية الطب

جامعة الفيوم

الملخص العربي

السمنة المفرطة مرض وبائي، و انتشاره من المتوقع أن يزيد في المستقبل. حالياً، جراحات السمنة هي العلاج الوحيد الفعال للسمنة المفرطة و هناك العديد من الجراحات التقييدية التي أصبحت تستخدم من قبل جراحي السمنة حول العالم، كما بدأت جراحة تكميم المعدة في التفوق من حيث الشعبية علي الجراحات الأخرى.

الا انه وجد في بعض الحالات حدوث تمدد في حجم الجزء المتبقى من المعدة. الامر الذي قد يكون له تأثير سلبي على فقدان الوزن و هذه الدراسة تتناول نسبة حدوث هذا التمدد و مدى تأثيره على معدل فقدان الوزن السنة الاولى بعد العملية وذلك من خلال قياس حجم التمدد باستخدام الأشعة المقطعية، و هو أسلوب جديد و غير اجتياحي يستخدم لقياس حجم الأعضاء الداخلية و يتم إخراج النتائج باستخدام السنتيمتر المكعب كوحدة لقياس الأحجام.

ووجد من خلال الدراسة حدوث تمدد في حجم الجزء المتبقى من المعدة بنسب متفاوتة بين المرضى الا ان هذا التمدد ليس له تأثير سلبي على معدل فقدان الوزن الزائد مما يدل على ان حجم حجم الجزء المتبقى من المعدة ليس هو السبب الوحيد في نقص الوزن الزائد. و هذا التمدد قد يكون نتيجة لتعرض المعدة لعدة عوامل مثل سمك جدار المعدة و العادات الغذائية غير السليمة و قلة المتابعة بعد العملية.

و توصلنا في هذا البحث ان عملية تكميم المعدة هي خطوة - وان كانت اساسية - تبعتها عدة خطوات يجب على المريض ان يسلكها للوصول للهدف مثل وعي المريض الكافي لتغيير سلوكه الغذائي مع اهمية وجود اخصائي تغذية لمتابعة المريض