

البحث السادس

عنوان البحث:

دولوكستين قبل الجراحه على الام ما بعد الجراحه بعد الجراحه النسائيه بالمنظار : مراجعه منهجيه وتحليل تلوى للتجارب المعشاه ذات الشواهد

ملخص البحث:

الهدف:

لتقييم مدى فاعليه وأمان قبل الجراحه بأستخدام أولوكستين بعد الجراحه ، اداره الالم ، بعد جراحات منظار البطن لامراض النساء .

الطرق:

تم إجراء بحث منهجى فى مكتبه كوكورين ، بمبيد ، وشبكة اي سي اس للعلوم وسكوب من البدايه حتى سبتمبر ٢٠٢١ . اخترنا التجارب السريره العشوائيه التى قارنت الدولوكستين (مجموعه التدخل) مقابل الدواء الوهمى (مجموعه التحكم) بين النساء اللواتى يخضعن لجراحه لابارو النسائيه – جراحه المناظير . كانت نتائجنا الثانويه هى الوقت المطلوب لاول طلب مسكن بالدقائق ، وأستهلاك المسكن بعد العمليه باللميفرام ، ومدته الاقامه فى المستشفى بالايام والاثار الجانبيه .

النتائج:

تم تضمين أربع تجارب عشوائيه ذات شواهد مع عدد أجمالى مرضى ٢٤٤ مريضاً فى مراجعتنا المنهجيه والتحليل التلوى . كان طلب المسكن الاول مبكراً بشكل ملحوظ فى مجموعه الدواء الوهمى عن مجموعه الدولوكستين (الاحتمال = 0.03). بالإضافة الى ذلك ، قلل الدولوكستين بشكل كبير من أستهلاك المسكنات بعد العمليه الجراحيه مقارنة بالدواء الوهمى (فرق المتوسط = ١.٩٧ ، ٩٥% فاصل ثقاه (٣٠.٧٢-، ٥٣.٢٣) ، الاحتمال < ٠.٠٠١). ومع ذلك ، لم تختلف كلتا المجموعتين فى مدته الاقامه فى المستشفى والاثار الجانبيه .

الاستنتاج:

دولوكستين فى الادراه قبل امراض النساء وجراحه المناظير وجراحات المناظير الغير فعاله والفعاله – تثبت بعد الجراحه والالم وتخفيف الالم .