7- دراسة استرجاعية لحالات تمزق الأغشية السائل الامنيوسي قبل الاوان بمستشفى اسوان الجامعي

: الملخص العربي

:مقدمة

تمزق الأغشية قبل الأوان

هو مشكلة صعبة لأطباء التوليد. في العقود الثلاثة الأخيرة ، اتخذت بعداً جديداً بسبب تحديد عوامل الخطر الخاصة بها و تم تحسين نتائج الحالات المصابة بسبب تحسين طرق العلاج تمزق الأغشية قبل الأوان هو حدث شائع ومهم في التوليد. له تأثير كبير على النتائج الجنينية والأمومية ، مما يؤدي إلى مضاعفات الأم والجنين ، وقد يؤدي إلى المخاطر المباشرة مثل تدلي الحبل السري ، وضغط الحبل السري وانفصال المشيمة ، ومخاطر لاحقه مثل عدوى الأم أثناء الحمل او ما بعد الولادة ، وكذلك زيادة معدل العمليات القيصرية ومضاعفاتها

اسلوب الدراسة: تم اخذ الحالات

بمستشفى جامعة أسوان في الفترة من ١ يناير ٢٠١٣ . حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ وتم تشخيص الحالات عن طريق التاريخ المرضي و الفحص السريري و عمل موجات صوتية للحامل . تم استرجاع ملاحظات الحالة من قسم السجلات الطبية. تم إدخال البيانات في الكمبيوتر لإجراء تحليل إحصائي باستخدام حزمة إحصائية واحدة خاصة بالملكية وهي الحزم الإحصائي للعلوم الاجتماعية

:النتائج

معدل حدوث تمزق الأغشية قبل الأوان ١٠.٨٥ ٪ ، ومتوسط العمر المرضي ٢٨.٥ سنة. وعدد مرات الحمل السابق ٢٥.٤٧ ٪ حامل لأول مرة و ٥٢.٤٧ ٪ حامل عدد مرات اقل من خمسة و هناك ٢٢.٠٥ ٪ حامل عدد مرات اكثر من خمسة . متوسط عمر الحمل ٣٤ أسبوعاً
الولادة القيصرية (٣٨.٢٧ ٪) الولادة الطبيعية ٦١.٧٢ ٪. حول اسباب الولادة القيصرية: ٢٨.٢٥ ٪ بسبب ضعف نبض الجنين و ٤٠.٤ ٪ فشل في تقدم الولادة و العمليات القيصرية السابقة ٣٤.٢ ٪ بالنسبة الى مضاعفات الجنين يوجد اضطراب التنفس ٢.٢٨ ٪ و ١٠.٠٧ ٪ من الحالات تم ادخالهم وحدة المبتسرين وبالنسبة لحدوث عدوى ٥.١٣ ٪ اما بالنسبة لمضاعفات الامهات التهاب الغشاء الامنيوسي ٠.٥٧ ٪ ونزيف بعد الولادة ١١.٥٩ احمى النفاس ٨.٥٥ ٪

الاستنتاجات e

إن المعالجة الفردية لحالات تمزق الأغشية قبل الأوان اعتمادا في ذلك على عمر الحمل وخطر حدوث المضاعفات لكل حالة هي أفضل طريقة لتحقيق نتيجة جيدة للأجنة والامهات