

## تقييم التهاب بطانة الرحم تحت الاكلينكى فى العقم الاولى غير المبرر

### ملخص البحث باللغة العربية:

**المقدمة:** من أكثر الحالات شيوعاً في عيادات الخصوبة هو العقم غير معلوم السبب ولكن في الأونة الأخيرة تم ربط التهاب بطانة الرحم المزمن بفشل زرع الجنين والعقم

### الهدف من العمل:

كان الغرض من الدراسة هو تقييم التهاب بطانة الرحم المزمن تحت الإكلينكى في حالات العقم الأولى وأيضاً تقييم فوائد إجراء منظار الرحم في تشخيص التهاب بطانة الرحم الكامن كمكمل للنظريات الحالية.

### طرق الدراسة:

أجريت الدراسة الحالية على 50 مريضة تحت سن الأربعين في عيادة العقم بمستشفى المطرية التعليمي بالتعاون مع قسم النساء والتوليد بجامعة الفيوم يشكين من عقم أولي غير معلوم السبب خلال الفترة من مايو 2018 إلى إبريل 2019. تم تقسيم المريضات بشكل عشوائي إلى مجموعتين متساويتين. مجموعة أ و مجموعة ب كلا منها 25 مريضة:

1. في المجموعة أ أخضعت المريضات لمنظار الرحم للحصول على عينة من بطانة الرحم.

2. في المجموعة ب تم إخضاع المريضات لأخذ عينة من بطانة الرحم بواسطة *Pipelle de cornier*.

### نتائج الدراسة:

وجدنا في هذه الدراسة أن 30 مريضة ( 60 % ) مصابات بالتهاب بطانة الرحم المزمن. تم تشخيص 21 ( 42 % ) بواسطة العينات المأخوذة من قبل تنظير الرحم بينما تم تشخيص 9 ( 18 % ) من المريضات بواسطة العينات المأخوذة بواسطة

### **.Pipelle**

وكانت دقة منظار الرحم في تشخيص التهابات بطانة الرحم في دراستنا 52 % .

### الاستنتاج:

إلتهاب بطانة الرحم المزمن يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار في علاج العقم الأولى غير معلوم السبب وحيث أن منظار الرحم الأولى ومع ذلك يجب إستكمال التشخيص بأخذ عينة من بطانة الرحم.

### مكان وتاريخ نشر البحث:

- Biomedicine and Nursing
- 2006