

الكلاميديا تاركوماتيسو وادلياتشوندروفيللا بين السيدات اللاتي أُصبن بإجهاض مبكر غير معلوم السبب.

ملخص البحث باللغة العربية:

الهدف من البحث:

تحديد مدى إنتشار الكلاميديا تاركوماتيس واداليا تشوندروفيللا وإلتهابات الجهاز التناسلي الأخرى وعلاقتها بحدوث الإجهاض المبكر غير معلوم السبب.

طرق الدراسة:

أجريت الدراسة بمستشفى جامعة الفيوم وتضمنت مجموعتين:

مجموعة أ :مجموعة الدراسة- :

300 سيدة تعرضن للإجهاض التلقائي غير معلوم السبب أو الإجهاض الفانت في عمر الحمل (8 :14 اسبوع).

مجموعة ب :مجموعة ضابطة- :

وتضمنت 300 سيدة حامل حمل طبيعي في نفس عمر الحمل (8 :14 اسبوع).

ثم أخذ 3 مسحات من عنق الرحم وأضيف أخذ عينات من المشيمة من مجموعة الدراسة.

النتائج:

عدوى *Candida* و *Trichomonas vaginalis* تمثل العدوى الرئيسية في كل المجموعتين. عينات المشيمة إيجابية في 20%

21 حالة إيجابية عن طريق الزرع و 3 و 9 حالة عن طريق PCR.

Pan-chlamydiales 0. تم إكتشافه في 92 عينة عند الرحم المهبلي من كل المجموعتين و

39 عينة مشيمية من مجموعة الدراسة مع وجود فرق معتد به إحصائياً.

تم الكشف عن كلاميديا تاركوماتيس عن طريق PCR بين المجموعتين في عينات عنق الرحم المهبلي في 50 سيدة في مجموعة الدراسة و 33 سيدة في المجموعة الضابطة.

تم إكتشاف *Waddlia chondrophila* في عینتين من عنق الرحم من كلا المجموعتين و 1 عينات مشيمية من مجموعة الدراسة.

الاستنتاج:

عدوى الكلاميديا تاركوماتيس واداليا تشوندروفيللا هي عوامل محتملة للإجهاض لأن إنتشارهم أعلى في عينات عنق الرحم والمشيمة من السيدات المصابات بالإجهاض المبكر غير معلوم السبب.

مكان وتاريخ النشر:-