

فعالية وسلامة بضع الثقبة العنقية الخلفية كتقنية عملية لاعتلال الجذور العنقية.

## خلاصة

الخلفية: اعتلال الجذور الناجم عن مرض القرص العنقي هو مرض شائع في العمود الفقري المتخصصين. في حين أن طرق العلاج غير الجراحية يمكن أن تدير الحالة بشكل فعال، إلا أن التدخلات الجراحية متاحة كخيار إذا كان العلاج المحافظ غير ناجح. ال  
الهدف من هذه الدراسة هو تقديم وصف موجز لما لدينا لقاء حديث مع بضع الثقبة العنقية الخلفية علاج اعتلال الجذور عنق الرحم.  
الهدف من الدراسة: تقديم تجربتنا قصيرة المدى فيما يتعلق ببضع الثقبة العنقية الخلفية لعلاج اعتلال الجذور العنقية. سيتم الإبلاغ عن الفعالية والسلامة والتقنية.  
المرضى والطرق: تم إجراء مراجعة على موقعنا قاعدة بيانات المؤسسة تغطي الفترة من 2019 إلى 2022. حددت المراجعة 35 مريضاً أصيبوا بالمرض على التوالي خضعت لعملية بضع الثقبة العنقية الخلفية. قارنت الدراسة المقياس التناظري البصري قبل التدخل (VAS) مع خدمات القيمة المضافة بعد التدخل في ثلاثة أشهر (بعد خدمات القيمة المضافة 2) ل تقييم مستويات آلام الرقبة (VASn) وآلام الذراع (VASa).  
النتائج: فيما يتعلق بالنتائج الوظيفية فهي متوسطة كان VASn Pre 6.17، وكان متوسط VASn النهائي 2.09، و كان متوسط VASa Pre 6.97 وكان متوسط VASa النهائي 1.29. كان الفرق بين VASn Pre و VASn Final ذات دلالة إحصائية حيث كانت القيمة p أقل من 0.05. ال  
كان الفرق بين VASa Pre و VASa Final إحصائياً كبيرة حيث كانت القيمة p أقل من 0.05. لا مضاعفات تم الإبلاغ عنها في دراستنا.  
الخلاصة: كان هناك تحسن سريري كبير لوحظ في المرضى الذين يعانون من اعتلال الجذور الناجم عن مرض القرص العنقي الذي خضع للعلاج الخلفي بضع الثقبة العنقي. الإجراء المذكور أعلاه قد تعتبر آمنة وفعالة في علاج علم الأمراض المذكور.