

التحسن الإكلينيكي ومن خلال الأشعة المقطعية في حالات تفريغ نزيف المخ عن طريق المنظار الجراحي

توطئة للحصول على درجة الماجستير في جراحة المخ والأعصاب

رسالة مقدمة من

الطبيب/ محمد ضياء الدين سيد محمود الفخراي
بكالوريوس الطب والجراحة
كلية الطب – جامعة الفيوم

إشراف

أ.د/ حسن إسماعيل لطفي الشافعي
أستاذ جراحة المخ والأعصاب
كلية الطب – جامعة القاهرة

أ.م.د/ محمد حسين محمد علي
أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب
كلية الطب – جامعة القاهرة

د/ أحمد حسام الدين حسين عبدالحميد
مدرس جراحة المخ والأعصاب
كلية الطب – جامعة الفيوم

كلية الطب
جامعة القاهرة
2024م

يعد تفريغ النزيف الدموي للمخ بالتدخل المحدود عن طريق المنظار خيارا علاجيا واعداد للنزيف داخل المخ ومع ذلك، لا تزال التقنية بحاجة للمزيد من التجديد والتحسين.

قمنا بهذه التجربة السريرية لاستخدام هذه التقنية لتفريغ النزيف داخل المخ فوق الخيمة المخية وتقييم نتائجها السريرية وعن طريق الأشعة المقطعية.

اشتملت الدراسة على خمسة عشر مريضا وكان النزيف داخل القشرة المخية هو المكان الأكثر شيوعا بنسبة 66.7%، وكان متوسط حجم النزيف قبل الجراحة 60 سم مكعب ومتوسط الحجم المتبقي بعدها 6 سم مكعب وكانت نسبة الاحتمالية 0.001، ومتوسط درجة مقياس النزيف داخل المخ كان 3، ومتوسط مستوى الوعي قبل اجراء الجراحة 12 وبعدها 13.8 ، وكانت نسبة الاحتمالية > 0.001

وكانت هذه بعض العوامل ذات الدلالة الإحصائية التي قد تكون مرتبطة بالوفيات.