الطرق المختلفه لعلاج الآم العصب الخامس

رسالة مقدمة توطئة للحصول على درجة الماجستير في الجراحه العامه

من الطبيب محمد جابر عبد التواب

المشرفون

الأستاذ الدكتور / شريف محمد رامز أستاذ الجراحه العامه كلية الطب- جامعة القاهره

الأستاذ الدكتور/ محمد طارق الفار أستاذ جراحة المخ و الأعصاب كلية الطب- جامعة القاهره

الدكتور / حسام الدين حسني عبد الوهاب مدرس الجراحه العامه كلية الطب- جامعة القاهره

> كلية الطب جامعة القاهره 2008

الملخص العربي

ألم العصب الخامس هو الم حاد مفاجئ ،شديد، قصير المده يشبه الصدمات الكهربيه ومرتجع يأتي في نفس اماكن توزيع العصب الخامس .توجد نظريات عده لأسباب الام العصب الخامس منها شد او ضغط علي جذر العصب الخامس ،خلل في جذع المخ أو العقد القاعديه أو اليات تعديل الا

الألم القشري مشاكل الاوعيه الدمويه الدماغيه هي اكثر النظريات المقبوله.

تشخيص الآم العصب الخامس يتم بالفحص الأكلينيكي في الأساس يساعد الفحص بالرنين المغناطيسي في استباعد الأسباب الثانويه لإصابات العصب الخامس ، اكتشاف التغير ات الباثولوجيه بجذع العصب الخامس و الأوعيه الدمويه الضاغطه على جذع العصب.

يمثل عقار كاربامازيبين هو العلاج الأمثل . أوكسكاربازيبين، باكلوفين، لاموتريجين، فينيتوين و توبيراميت تمثل عقاقير مفضله أيضا اضافة أكثر من دواء و طرق العلاج المتعدده تمثل حل لهذه امشكله.

تخفيف ضغط الأوعيه الدمويه الدقيقه تمثل الحل الجراحي الأمثل في حالات فشل العلاج الدوائي.

المرضي الذين يعانون من أمراض مصاحبه مزمنه أو تصلب متعدد يحتاجون للعلاج بسكينة جاما،الضغط بالبالون عن طرق الجد،بضع جذور العص الخامس بالجليسرول، التخثير بالتردد الحراري.

القطع الجزئي للعصب الحسي يتم في حالة عدم وجود ضغط علي العصب الخامس أثناء الجراحه.

استخدام المنظار الجراحي لإزالة الضغط علي العصب يتم منفردا أو بمساعدة الميكروسكوب الجراحي. يساعد ذلك في رؤيه أوضح لجذع العصب و الأوعيه الدمويه الضاغطه عليه وأجزاء كبيره من جذع المخ.

فاعلية وكفاءة ازالة الضغط علي العصب تتم عن طريق المنظار الجراحي كما انه يساعد في رؤيه أفضل للزوايا التي قد لايدركها الميكروسكوب الراحي كما أنه لا يتطلب شد علي انسجة المخ.