

دراسة استرجاعية عن تأثير العلاج الكيميائي قبل الجراحي في المحافظة علي الثدي لدي
مرضي سرطان الثدي المتقدم المترددين علي قصر العيني ومستشفيات جامعة الفيوم

مقدمة من

ط/ روفيده محمد علاء الدين محمد

بكالوريوس الطب والجراحة - جامعة الفيوم

توطئة للحصول علي درجة ماجستير علاج الأورام

تحت اشراف

أ.د/ محمد أحمد حسن

أستاذ علاج الاورام - قصر العيني - جامعة القاهرة

أ.م.د/ لؤي محمد حسن قاسم

أستاذ مساعد علاج الاورام - قصر العيني - جامعة القاهرة

د/ رغده يحيى أبو العلا

مدرس علاج الاورام - كلية الطب - جامعة الفيوم

كلية طب
جامعة القاهرة
2023

الملخص العربي

سرطان الثدي هو المرض الخبيث الأكثر شيوعاً لدى النساء، وهو أكثر عدوانية لدى المرضى الصغار في مصر، يعد سرطان الثدي أكثر الأورام الخبيثة شيوعاً لدى النساء، حيث يمثل 38.8% من أنواع السرطان لدى المصريين، ويقدر عدد حالات سرطان الثدي بنحو 22700 حالة في عام 2020 ومن المتوقع أن يبلغ حوالي 46000 حالة في عام 2050

في الفئة العمرية (15-49) عاماً، يعد سرطان الثدي أكثر الأورام الخبيثة شيوعاً بنسبة (13%)، يليه سرطان الكبد (12%) والرئة (9%).

سرطان الثدي هو مرض متنوع مع العديد من المراحل السريرية التي تتراوح من المرحلة الأولى المبكرة إلى المرحلة الرابعة المتأخرة .

تم إجراء العديد من التجارب السريرية لتحديد أفضل الطرق لإدارة هذا المرض.

لقد أجرينا هذه الدراسة الاسترجاعية لمعرفة تأثير العلاج الكيميائي قبل الجراحي في المحافظة علي الثدي وتحقيق الاستجابة الباثولوجية الكاملة لدي مرضي سرطان الثدي المتقدم.

وجاءت النتائج علي النحو التالي:

12.6% من المرضى كانوا في المرحلة الاكلينيكية الثانية، 87.4% كانوا في المرحلة الاكلينيكية الثالثة.

أجري 47% من المرضى جراحة استئصال جزء من الثدي فقط ، 35% من المرضى حققوا الاستجابة الباثولوجية الكاملة ، وكان 26.2% من المرضى سنهم أقل من 40 سنة.

تم تقسيم الأنواع الفرعية الجزيئية لمرضانا إلى luminal A, luminal B, Her2 enrich and TNBC تمثل 47% و 18% و 17% و 18% من جميع مجموعات الدراسة على التوالي.

وتم تحقيق الاستجابة الباثولوجية الكاملة للمرضي luminal A, luminal B, Her2 enrich, and TNBC بالنسب المئوية 22.2%, 25.5%, 55.6%, 52.9% علي التوالي.

خلال المتابعة لمدة 69 شهراً، كان 19% من المرضى يعانون من انتشار للورم بأماكن متفرقة بالجسم، و 4% لديهم أرتجاع محلي للورم ، و 3% عانوا من أرتجاع محلي وانتشار.

وجاء معدل البقاء بدون مرض لجميع المرضى 65.9% , ومعدل البقاء علي قيد الحياة 84.9%