

## اصلاح انحراف الأهداب التراكومي بالجفن السفلى باستخدام عملية اعادة تموضع الطبقة الأمامية

### للجفن في مقابل عملية شق الطرس

#### الملخص العربي:

لاتزال التراكوما وماتسببه من انحراف الأهداب السبب الرئيسي للعمي الذي يمكن الوقاية منه علي مستوي العالم. علي مر الأعوام وصفت الكثير من التقنيات الجراحية لأصلاح انحراف الأهداب التراكومي بالجفن العلوي ولكن هناك ندرة شديدة في الأبحاث المنشورة فإيا يخص المشكلة بلجفن السفلي. تهدف هذه الدراسة الي مقارنة نتائج عملية شق الطرس و عملية اعادة تموضع الطبقة الأمامية للجفن في اعلاج انحراف الأهداب التراكومي بالجفن السفلي. وقد شملت هذه الدراسة العشوائية المنضبطة ٦٠ مريضاً يعانون من مرض انحراف الأهداب التراكومي بالجفن السفلي. وكانت قياسات النتائج الرئيسية هي : وجود ارتجاع لانحراف الأهداب بعد العملية والمظهر الجمالي للجفن.

تم اجراء كل عملية لثلاثين مريضاً تم توزيعهم بشكل عشوائي. وقد أشارت النتائج الي أن معدل ارتجاع انحراف الأهداب كان أعلي في مجموعة شق الطرس مقارنة بمجموعة اعادة تموضع الطبقة الأمامية للجفن (٢٠% في المجموعة الأولى مقارنة ب ٥٣.٦% في المجموعة الثانية) عند نهاية فترة المتابعة. كان عدم الرضاء عن المظهر الجمالي للجفن أكثر شيوعاً بين المرضى في مجموعة اعادة تموضع الطبقة الأمامية في الفترات الأولية بعد اجراء العملية. ولكن عند نهاية فترة المتابعة لم يعد هناك فرق ذو مغزي بين المجموعتين.

في النهاية قدمت هذه الدراسة دليلاً قوياً علي أن عملية اعادة تموضع الطبقة الأمامية للجفن هي الأكثر فعالية في علاج انحراف الأهداب التراكومي بالجفن السفلي للعين.