

البحث الرابع

نمط التهاب القرنية الوسيط في الفوج المصري

الغرض: لوصف التجربة السريرية مع التهاب العنب المتوسط في ستة مراكز المصرية الثالثة للعيون. الطرق: مراجعة مخطط استعادي متعدد المراكز لجميع المرضى الذين يعانون من التهاب العين المتوسط الذين شوهوا في ست عيادات إحالة التهاب العين في مصر بين يناير 2010 ويناير 2017. النتائج: شملت الدراسة ما مجموعه 781 مريضاً بالتهاب العين الوسيط. وتألفت مجموعة الدراسة من 282 مريضاً و499 من الإناث. في أكثر من نصف مجموعتنا (58.77%) ، لم يتم تأكيد أي سبب محدد. أما المرضى الباقون فقد كانوا مصابين بالساركويد (16.26 في المائة)، والسل (14.85 في المائة)، والتصلب المتعدد (9.09 في المائة)، وتينو (1.02 في المائة). في نهاية دراستنا، كان 62% من العيون المصابة أفضل من الاستنتاج: أكثر من 40% من مرضانا مع التهاب العين المتوسط كان BCVA 20/40 الساركويد، والسل، والتصلب المتعدد، أو تينو كما المسببات الكامنة. ونظراً لاعتلالها المحتمل، فإن هذه الأمراض تحتاج إلى النظر فيها لدى المرضى المصريين الذين يعانون من التهاب العين المتوسط.