



الملخص العربي للبحث المقدم من  
الدكتور / القاسم أحمد الجميل أحمد  
مدرس طب الأطفال للحصول على اللقب العلمي  
لوظيفة أستاذ مساعد

كلية الطب – جامعة الفيوم  
قسم الأطفال

البحث السابع

(بحث منفرد منشور دولي – غير مشتق من رسالة علمية)

عنوان البحث : دراسة بينية مقارنة للإصابة بقمل الرأس بين أطفال المدارس الابتدائية في محافظتي الفيوم و المنوفية.

**Epidemiological Comparative Study of Pediculosis Capitis Among Primary School Children in Fayoum and Minofiya Governorates, Egypt.**

المشاركون في البحث : \*د. طلال عبد الرحيم، \*د. نجلاء أحمد الشربيني، \*\*\*د. القاسم أحمد الجميل أحمد،  
\*\*\*\*د. غادة السيد، \*\*\*\*\*د. ندى مصطفى، \*\*\*\*\*د. سالى شاهين.  
\*قسم الجلدية و التناسلية و الذكورة، \*قسم طب المجتمع، \*\*\*قسم طب الاطفال- جامعة الفيوم  
\*\*\*\* قسم الجلدية و التناسلية و الذكورة- جامعة المنيا، \*\*\*\*\* قسم الجلدية و التناسلية- مستشفى بولاق،  
\*\*\*\*\*مستشفى باجور- وزارة الصحة والسكان.

مكان وتاريخ النشر : مجلة صحة المجتمع، أغسطس ٢٠١٤.

**Journal of Community Health, (August) 2014. (Pubmed).**

الملخص العربي :

خلفية: تعد الإصابة بالقمل مشكلة صحية عامة متكررة. ويعد نمط وانتشار القمل معتمدا على العديد من العوامل الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية. ومن الشائع بين أطفال المدارس وخاصة في المرحلة الابتدائية. مما قد يؤثر على أدائهم الدراسي.

الأهداف: هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى انتشار الإصابة بقمل الرأس بين طلبة المدارس الابتدائية، في (منطقتي الفيوم و باجور) واستكشاف العوامل المؤهلة إلى الإصابة بقمل الرأس في كل من المدارس الحكومية والخاصة.

المنهجية: كانت الدراسة مستعرضة صافية، و قد أجريت في محافظتين. (محافظتي الفيوم والمنوفية) التي تمثل مصر العليا والسفلى على التوالي خلال العام الدراسي ٢٠١٢-٢٠١٣. وقد تم اختيار الطلاب من خلال أخذ العينات العشوائية الطبقيّة متعددة المراحل من مختلف الدرجات مع ما مجموعه (١٠٩٣٥ طالبا). النتائج: كان انتشار قمل الرأس في مجموعة الدراسة (١٦,٧%). كانت الإصابة عالية في المدارس العامة (٢٠,٧%) عنها في المدارس الخاصة (٩,٠٤%) و الفتيات (٢٥,٨%) أكثر من الفتيان (٦,٢%) خصوصا الفتيات ذوات الشعر المغطى. كان هناك تأثير اجتماعي وديموغرافي على الإصابة بالقمل مثل الإقامة، ووجود إمدادات المياه، وعدد غرف المنزل وعدد أفراد الأسرة. الخلاصة: نستخلص من ذلك أن الإصابة بقمل الرأس مشكلة شائعة في الطفولة و متعلقة بقلّة النظافة والحالة الاجتماعية الاقتصادية. هناك حاجة لتعاون الجهود بين الأسرة والمدرسة، والمجتمع، وسائل الإعلام، لخلق البيئة التي تحدد السلوكيات الصحية وتعزيز الصحة.

#### التقييم :

الدرجة :	%	اسم الفاحص :أ.د./
التقدير :		التوقيع :