

(بحث مشترك منشور – مشتق من رسالة علمية)

عنوان البحث: تقييم معارف وممارسات مقدمي الرعاية الصحية حول اليرقان الوليدي في

وحدات الرعاية الصحية الأولية في محافظة الفيوم ، مصر.

**Assessment of Knowledge and Practices of Health Care Providers about
Neonatal Jaundice in Primary Health Care Units in Fayoum Governorate, Egypt**

المشاركون في البحث : *د. القاسم أحمد الجميل أحمد، د. وائل سيد محمد، *د. نجلاء أحمد الشربيني،

*** د. رهاب عويس أمين

*قسم طب الأطفال ، **قسم الصحة العامة – جامعة الفيوم.

***مستشفى الفيوم العام – وزارة الصحة والسكان

مكان وتاريخ النشر:

**Egyptian Journal of Paediatrics Vol 33, No 3&4 (September & December), 591-
604, 2019.**

الملخص العربي :

خلفية: اليرقان الوليدي هو واحد من الاضطرابات الأكثر شيوعا بين الأطفال حديثي الولادة. ومع ذلك ، فهو أحد الأسباب الرئيسية لتلف الدماغ الذي يمكن الوقاية منه ، والإعاقة الجسدية والعقلية ، والموت المبكر بين الرضع في المجتمعات.

الهدف: تهدف هذه الدراسة إلى تقييم المعرفة والممارسات للعاملين في الرعاية الصحية الأولية حول اليرقان الوليدي.

المواضيع والطرق: أجريت دراسة وصفية مستعرضة في مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية في المقاطعات الست في محافظة الفيوم بين مجموعة من 315 ممرضة و 152 طبيباً يستخدمون استبيانات ذاتية التنظيم ومهيكله واستبيانات ، واللغة العربية للمرضين الإنجليزية للأطباء. قام كلا الاستبيانين بتقييم معرفة وممارسة العاملين الصحيين حول الوصف والأسباب والعلاج الفعال ومضاعفات اليرقان الوليدي.

النتائج: فيما يتعلق باليرقان الوليدي ، كانت درجة المعرفة مرضية بالنسبة لأطباء الدراسة ($20,4 \pm 3,1$ من المجموع 38) مفترقة بالنسبة للممرضات ($13,8 \pm 4,5$ من المجموع 32) ، في حين أن ممارسات كل من الأطباء والممرضات كانت بشكل عام جيدة (برصيد 14,8 $\pm 2,1$ و $7,6 \pm 1,8$ من مجموع 24 و 12 ، على التوالي).

الخلاصة: كانت معرفة العاملين في مجال الرعاية الصحية الأولية حول اليرقان الوليدي غير كافية بشكل عام وقد يتسبب تأخيرات محتملة غير مرجحة للعلاج الفعال. هناك حاجة إلى تدريب منتظم مستمر للعاملين في الرعاية الصحية الأولية لضمان العلاج الفعال وتقليل مضاعفات اليرقان الوليدي.