



الملخص العربي للبحث المقدم من
الدكتور / أشرف سيد كامل عطاالله مدرس طب الأطفال
للحصول على اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد



كلية الطب – جامعة الفيوم
قسم الأطفال

البحث الثامن

(بحث مشترك- مقبول للنشر – غير مشتق من رسالة علمية)

عنوان البحث :

موقف اطباء الأطفال تجاه التحويل لعمل استئصال اللوزتين مع أو بدون اللحمية
Attitude of Pediatricians Towards Referral for Tonsillectomy and/or Adenoidectomy

المشاركون في البحث :

د. أشرف سيد كامل* د. سيد على أمين د. نجلاء الشرييني**

قسم طب الأطفال* – **قسم الصحة العامة- جامعة الفيوم

مكان وتاريخ النشر: مقبول للنشر في المجلة المصرية لطب الأطفال المجلد 33 العدد 3و4 (سبتمبر وديسمبر) 2016
Egyptian Journal of Pediatrics Vol. 33, No 3&4 (September and December), 2016

الملخص العربي :

مقدمة وهدف البحث

عملية إستئصال اللوزتين مع أو بدون اللحمية هي إجراء قديم جدا ويعود تاريخيا الي القرن الاول الميلادي. ويعتبر من الإجراءات الشائعة التي يتم اجرائها بواسطة اخصاصي الأنف و الأذن والحنجرة في كل انحاء العالم. وعندما يتم اجرائها لواعى مناسبة و دقيقة فعندها تساهم في تحسين نوعية الحياة وفي بعض الاوقات تساعد في تخفيف وعلاج صعوبات التنفس. بعض الأبحاث الحديثة وضحت ذلك أن الدواعى الحالية لإستئصال اللوزتين واللحمية في الاطفال تتباين كثير ما بين البلدان وبعضها و حتي بداخل نفس البلد.

الهدف من هذه الدراسة هو تقييم موقف اطباء الاطفال تجاه الاحالة لاستئصال اللوزتين واللحمية ومعرفة ما إذا كانوا يلتزمون بالدواعى الكافية لإجراء هذه العملية ومقارنتها بما يوجد حديثا بالمراجع والأبحاث العلمية الحديثة

خطة البحث:

أجريت دراسة مسحية مستعرضة علي 1000 طبيب أطفال . قمنا بإعداد استبيان عن الدواعى السائدة لاستئصال اللوزتين مع أو بدون اللحمية وقمنا بتوزيعه علي 1000 طبيب في محافظتي القاهرة والفيوم في المستشفيات الجامعية والمستشفيات العامة , فقط 675 من بين تلك الاستبيانات تم استرجاعها والتحقق من صحتها. و تم تجميع البيانات وتحليلها من الاستبيانات الصالحة من خلال اختبارات احصائية دقيقة.

النتائج والخلاصة:

675 من المستطلعين اكلو الاستبيان. 78 % منهم يحيل الي إستئصال اللوزتين مع أو بدون اللحمية في حالة توقف التنفس أثناء النوم و تقريبا مثل هذه النسبة ايضا تري ان استئصال اللوزتين ربما يؤثر علي مناعة الطفل. اكثر من 65 % من الاطباء يعتبر ان التهاب اللوزتين اكثر من 5 مرات سنويا هو داعى قوي لاستئصال اللوزتين. والحد الأدنى للعمر لاستئصال اللوزتين هو 3 سنوات (47%) و تبعه 4 سنوات (39%) حسب اعتقاد الأطباء. 50% من الاطباء يعتبر استئصال اللوزتين اجراء وقتي من الحمى الروماتيزمية و 40% منهم ادعوا انهم يتبعون ارشادات مرجعية لإحالة هذه العملية بينما عدد قليل من الاطباء يحيل الي استئصال اللوزتين في حالات فشل النمو أو رائحة الفم الكريهة أو بناء علي طلب الاباء او لمجرد ارتفاع في الإنزيم الخاص بالميكروب السبحى. غالبية المستطلعين بنوا موقفهم تجاه الاحالة الي استئصال اللوزتين مع أو بدون اللحمية معتمدين علي دلالات اكلينيكية او من خلال خبراتهم. و فقط 40 % علي ارشادات مرجعية حقيقية

التقييم :

اسم الفاحص :أ.د./

%

الدرجة :