

دراسة مستوى هرمون الاوكسيتوسين بين مستخدمي الهيروين وعلاقته
بسمات الشخصية و الاساءة اثناء الطفولة

رسالة مقدمة من

الطبيبة / أمانى مصطفى محمد

بكالوريوس الطب والجراحة العامة

توطئة للحصول على درجة الماجستير فى الامراض النفسية والعصبية

تحت اشراف

أ.د./ هانى حامد دسوقي

أستاذ الطب النفسى

كلية الطب – جامعة بنى سويف

والمشرف على قسم الطب النفسى – جامعة الفيوم

أ.د.م/ محمد رمضان سلطان

أستاذ م الطب النفسى

كلية الطب – جامعة الفيوم

أ.د/ هويدا أحمد عبد الرسول

أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية

كلية الطب- جامعة الفيوم

قسم الطب النفسى

كلية الطب

جامعة الفيوم

دراسة مستوى هرمون الاوكسيتوسين بين مستخدمي الهيروين وعلاقته
بسمات الشخصية و الاساءة اثناء الطفولة

رسالة مقدمة من

الطبيبة / أمانى مصطفى محمد

بكالوريوس الطب والجراحة العامة

توطئة للحصول على درجة الماجستير فى الامراض النفسية والعصبية

قسم الطب النفسى

كلية الطب

جامعة الفيوم

٢٠٢٢

ملخص الرسالة

ان اضطراب استخدام المواد الأفيونية بشكل عام و مادة الهيروين بشكل خاص هو ظاهرة منتشرة بشكل متزايد وتتميز بأعراض الانسحاب الشديدة، وعدم القدرة على التحكم في التعاطي، والرغبة الشديدة الناتجة عن المثبرات البيئية، والخلل الاجتماعي، والعزلة الاجتماعية.

ويعد الادمان مشكلة متزايدة في مصر والوطن العربي وكل دول العالم تعاني من تقشي هذا الوباء رغم الجهود المبذولة للسيطرة عليه و الحد من انتشاره .

تهدف هذه الدراسة الي قياس مستوي هرمون الاوكسيتوسين في الدم بين متعاطي مادة الهيروين ومقارنته بمجموعة من الاصحاء غير السابق لهم تعاطي اي مواد مخدرة ومقارنة مستوي هذا الهرمون بالسمات الشخصية وصددمات الطفولة في كلتا المجموعتين .

وقد أجريت الدراسة على مجموعة ٨٠ شخصا ، وشملت مجموعتين . المجموعة أ (ذوي سوء استخدام الهيروين)، والمجموعة ب (الأشخاص الأصحاء).

المقاييس النفسية:

خضعت المجموعتان للاتي :

- اخذ التاريخ المرضي للمتقدمين للدراسة وذلك لاستبعاد من لم يتوافقوا في الشروط السابق ذكرها في الدراسة .
- الموافقة المسبقة للتسجيل في الدراسة طبقا للقوانين المصرية .
- يتم تشخيص المرضى طبقا للدليل الامريكي لتشخيص الاضطرابات النفسية الخامس لمحوره الاول.
- تطبيق اختبار كولنجر لسمات الشخصية .
- تطبيق مقياس شدة درجة الادمان لمجموعة المرضى فقط .
- استبيان صدمات الطفولة .
- قياس نسبة الاوكسيتوسين في الدم .
- تحليل بول لعمل مسح شامل للمواد المخدرة

ولقد وجدنا انه يوجد علاقة عكسية بين نسبة مستوي هرمون الاوكسيتوسين في الدم و تعاطي مادة الهيروين ز كما انه كلما زاد تعرض الطفل لصددمات اثناء الطفولة كلما زادت احتمالية ادمانه المواد المخدرة في البلوغ و ايضا تميز بعض السمات الضخسية عند متعاطي مادة الافيون مثل السعي للكمال و البحث عن الجديد دائما

التوصيات

- تشير النتائج الى ان الفئة العمرية الاكبر لمتعاطي الهيروين في العينة تتراوح بين ١٨ - ٣٥ عام مما يوجه نظر الدولة والمسؤولين لزيادة التوعية بين طلاب الجامعات و عمال المصانع لتجنب انتشار تلك المواد الادمانية بينهم

- تحليل سمات الشخصية لدي المجموعتين و وجود سمات اكثر وضوحا لدى مجموعة المتعاطين يشير الى ضرورة ارفاق وسائل علاجية موجهه لتلك السلوكيات الناتجة عن سمات الشخصية لاحداث فرق علاجي مؤثر وواضح
- زيادة نسبة التعرض لصدمات نفسية و أذى جسدي ونفسي اثناء الطفولة يوجه عناية التربويين لتثقيف الاباء والامهات عن التعامل مع الاطفال والمرافقين لتجنب وقوعهم في مثل تلك التجارب الادمانية عند البلوغ والشباب
- ترابط كل تلك المحاور من سمات الشخصية و اضطرابات الطفولة و اضطرابات الهرمونات يساعد على النظر للواقع في تجربة الايمان كنظرة شمولية و العمل على كل المحاور لمحاولة الوصول لأعلي نتائج من العلاج والامتناع التام