

البحث الثالث

مريم ايهاب داود يعقوب	أسم الطبيب المتقدم
Oxytocin level among patients with opioid use disorder and its correlation with personality traits and perceived childhood trauma	عنوان البحث بالإنجليزية
مستوى الأوكسيتوسين بين المرضى الذين يعانون من سوء استخدام المواد الأفيونية وعلاقته بسمات الشخصية وصدمات الطفولة	عنوان البحث بالعربية
أ.د. هاني حامد دسوقى * ـ ا.د هويدا عبد الرسول * * ـ د. مريم ايهاب داود * * * ـ د. اماني مصطفى حزين * * * ـ ا.د. محد رمضان سلطان * * * ـ * ـ * * قسم الطب النفسي — كلية الطب ـ جامعة بني سويف ، ، * * قسم الباثولوجيا الاكلينيكية — كلية الطب ـ جامعة الفيوم * * * قسم الطب النفسي — كلية الطب ـ جامعة الفيوم	أسماء الباحثين
Middle East Current Psychiatry (2023) 30:20 https://doi.org/10.1186/s43045-023-00289-2	مكان النشر
28 February 2023	تاريخ النشر

الملخص العربي

الخلفية: تعتبر سمات الشخصية وسوء المعاملة في مرحلة الطفولة من العوامل التي تنبئ باضطراب تعاطي المخدرات. ناقشت العديد من الدراسات تأثير الأوكسيتوسين على سمات الشخصية وعلاقته بالطفولة وكيف يؤثر كلاهما على عملية الإدمان. كان الهدف الرئيسي هو مقارنة مستوى الأوكسيتوسين بين المرضى مع اضطراب وسوء استخدام المواد الأفيونية والارتباط المحتمل لمستوى الأوكسيتوسين مع الأبعاد الأساسية للسمات الشخصية والتجارب السلبية في مرحلة الطفولة في مجموعة المرضى. تم تقييم الاضطراب في أربعون مريضا من الذكور الذين يستخدمون المواد الأفيونية و 40 من الأصحاء المتطابقين في العمر والجنس ومقارنتهم فيما يتعلق بالأوكسيتوسين في الدم باستخدام AD والسمات الشخصية باستخدام المزاج وجرد الشخصية - مقياس (-TCI) المنقح، وصدمات الطفولة والأحداث السلبية باستخدام استبيان صدمة الطفولة.

النتائج: هناك فرق كبير بين مجموعة المرضى والمجموعة الضابطة فيما يتعلق بمستوى الأوكسيتوسين في الدم تم العثور عليه. علاقة سلبية مع قيمة p <0.05 p بين مستوى الأوكسيتوسين وكل منسمات الشخصية " البحث عن الجديد وتجنب الضرر ، بالإضافة إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة بين مستوى الأوكسيتوسين وكل من الاعتماد على المكافأة، والتوجيه الذاتي، وعناصر التعاون من (TCR-R) من بين الحالات التي تم العثور عليها. ولم تظهر الحالات ذات دلالة إحصائية الفرق في مستوى الأوكسيتوسين بين عناصر استبيان صدمة الطفولة (CTQ) المختلفة.

الاستنتاجات: التفاعل بين مستويات الأوكسيتوسين في الدم، والسمات الشخصية، وصدمات الطفولة لا بد من النظر في الإدارة مع المرضى الذين يعتمدون على الهيروين لأنه يلعب دورًا حاسمًا. الكلمات المفتاحية:الأكسيتوسين، سمات الشخصية، صدمات الطفولة، الهيروين