

### عنوان البحث الثالث:

توزيع ونتائج متلازمة التهاب الأوعية الدموية بين المصريين: دراسة متعددة المراكز تشمل ٦٣٠ مريضا

### الملخص العربي:

مقدمة / الأهداف: الدراسات التي تصف وبانيات التهاب الأوعية الدموية في الشرق الأوسط وأفريقيا محدودة. والهدف من هذه الدراسة متعددة المراكز هو لوصف توزيع متلازمات الأوعية الدموية بين مرضى التهاب الأوعية الدموية المصرية التي ينظر إليها الروماتيزم. الطريقة: تم استعراض ملفات المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالتهاب الأوعية الدموية بين يناير / كانون الثاني ٢٠٠٢ وديسمبر / كانون الأول ٢٠١٦، وتم تصنيفهم وفقا لمؤتمر تشايبيلهيل كونسينسوس حول تسميات التهاب الجهاز الهضمي الجهازية للأوعية الدموية لعام ٢٠١٢ والمعايير الخاصة بالمرض. تم حساب مؤشر تلف (VDI) الأوعية الدموية لجميع المرضى في آخر زيارة

النتائج: تم دراسة ستمائة وثلاثين مريضا بعمر متوسط عند بداية المرض  $30,1 \pm 16,8$  (المدى ٩ أشهر - ٧٤ سنة)، منهم ٢٦٤ (٤١,٩٪) ذكور و ٣٦٦ (٥٨,١٪) إناث. تم الكشف عن التهاب الأوعية الدموية المرتبط بفيروس في ١٥١ (٢٤٪)، ومرض بهجت في ١٤٨ (٢٣,٥٪)، الغلوبولين المناعي التهاب الأوعية الدموية C التهاب الكبد في ١٠١ (١٦٪)، التهاب الأوعية الدموية المرتبطة الذئبة الحمامية الجهازية في ٩٣ (١٤,٨٪)، و التهاب الشرايين تاكاياسو في ٣٣ (٥,٢٪)، ومرض كاواساكي في ٢٢ (٣,٥٪) المرضى، على التوالي. كانت متلازمات الأوعية الدموية- الأخرى غير شائعة، وتمثل كل منها >٢٪ من الحالات المدروسة. كان متوسط فدي  $2,7 \pm 0,08$  (المدى (VDI=0) -١٣). فقط ٦٣٠/١٠٩ (١٧,٣٪) مريض لم يكن لديهم الأضرار المرتبطة بالتهاب الأوعية الدموية وقد سجلت الوفيات في ٣٦ (٥,٧٪) من المرضى. ومن بين هؤلاء، كانت ٢٧ حالة وفاة مرتبطة بالتهاب الأوعية الدموية.

الاستنتاجات: التهاب الأوعية الدموية المرتبطة بفيروس التهاب الكبدى سي و مرض بهجت كانت الأكثر شيوعا للمتلازمات الوعائية