



## البحث الثامن: بحث فردى و منشور دوليا

**عنوان البحث:** تقييم وظائف التنفس فى المرضى المصرىين المصابون بالروماتويد المفصلى

**مكان و تاريخ النشر:** بحث فردى منشور دوليا – غير مأخذ من رسالة

### المشاركون فى البحث:

د. راندا ابراهيم أحمد – مدرس الصدرية- كلية الطب- جامعة الفيوم

د. نيرمين أحمد فؤاد.مدرس الروماتيزم و التأهيل- كلية الطب- جامعة الفيوم

د. نجلاء عاطف احمد.مدرس الفيسيولوجى - كلية الطب-جامعة الزقازيق

### الملخص العربى:

الروماتويد المفصلى هو مرض مناعى يؤثر بالاساس على المفاصل، و من الشائع أن يصاب به أعراض أخرى غير المفاصل. هدف البحث: تقييم التغيرات فى وظائف التنفس التى من الممكن ان تحدث فى مرضى الروماتويد المفصلى. الطريقة: اشتملت الدراسة ١٣٠ مريض مصاب بمرض الروماتويد المفصلى بالإضافة الى ١٠٠ فرد متطوعين من الاصحاء مطابقين فى السن و النوع كمجموعة تحكيم. وقد تم تقييم المرضى بالأشعة المقطعة للصدر، قياس وظائف التنفس و حساب كلا من FVC، FEV<sub>1</sub>، FEF<sub>25-75</sub> بجهاز قياس وظائف التنفس، كما تم قياس التشبع بالاكسوجين و عمل اختبار السير ٦ دقائق و قياس ضغط الشريان الرئوى بجهاز الايكو. النتائج: ١٨ من المرضى انانث (%٩٠.٨)، ١٢ ذكور (%٩٠.٢)، متوسط العمر  $٤٨.٠٢ \pm ١٣.٩$  سنة. في مرضى الروماتويد المفصلى كان متوسط FVC  $٦٧.٨ \pm ١٩.٩$ ، FEV<sub>1</sub>  $٥٦.٦ \pm ٢٠.٥$ ، FEV<sub>1</sub>/FVC  $٨٢.٤ \pm ٢٠.٠$ . جميع قياسات الرئة في مرضى الروماتويد كانت اقل من مجموعة الاكسوجين  $٩٣.٨ \pm ٩٣.٨$ %. جميع قياسات الرئة في مرضى الروماتويد كانت اقل من مجموعه التحكم. متوسط المسافة في اختبار السير ٦ دقائق  $٣٠٢.١ \pm ٧٦.٥$  متر، %١١.٥ حدث عدم اشباع، %٢٦.٢ لم يستطيعوا القيام بالاختبار. وقد كان النمط التقييدى وجد في %٥٠.٨ من المرضى، ارتفاع ضغط الرئة وجد في ٣٩ مريض (%٣٠) بمتوسط  $٤٢.٤ \pm ١٩.٠$ . كان النمط الشبكي هو الاغلب (%٣٦.٩) و يتبعه نمط عتمة الزجاج المصنفر (%٣٣.١). الخلاصة: انتماط كثيرة من تغيرات وظائف التنفس من الممكن ان تحدث في مرضى الروماتويد المفصلى، النمط التقييدى هو الملمح الغالب مع زيادة بسيطة في ضغط الرئة. لابد من تقييم مرضى الروماتويد لاي تغيرات في الرئة في ظهور اي اعراض لها.