

دراسة التأثيرات الدوائية الضارة للأدوية المضادة للفيروسات المستخدمة في علاج التهاب الكبد الفيروسي (سي) المزمع في محافظة الفيوم ، مصر - دراسة التيقظ الدوائي

Study of Adverse Drug Effects of Direct-Acting Antivirals for Chronic HCV Infection at Fayoum Governorate, Egypt - A Pharmacovigilance Study

Eman I. Ahmed, Wafaa Y. Abdel Wahed, **Essam A. Hassan** and Tarek I. Ahmed

المشاركون في البحث :- ايمان احمد - وفاء عبد الواحد- عصام علي حسن- طارق احمد

قسم الفارماكولوجي ، كلية الطب ، جامعة الفيوم ، الفيوم ، مصر
قسم الصحة العامة وطب المجتمع ، كلية الطب ، جامعة الفيوم ، الفيوم ، مصر
قسم الأمراض المتوطنة، كلية الطب ، جامعة الفيوم ، الفيوم ، مصر
قسم الباطنه ، كلية الطب ، جامعة الفيوم ، الفيوم ، مصر
مكان النشر بحث منشور في

Journal of currentdrugsafety.2018

ملخص البحث

تم استخدام مجموعات متعددة من الادويه المضادة للفيروسات المباشرة (DAAs) ضد الطرز الوراثة المختلفة لفيروس التهاب الكبد (سي) وفي أنواع مختلفة من المرضى. على الرغم من كونها فعالة وتتميز بمعدل منخفض للغاية من الآثار الضارة في التجارب السريرية الا انه تتوافر بيانات قليلة عن الآثار السلبية لها في دراسات الحياة الحقيقية. لذلك كان الهدف من هذه الدراسة هو تحديد حدوث و تحديد نمط التفاعلات الدوائية الضارة (ADRs) التي تسببها DAAs ؛ ومزجها مع الريبافيرين .و أجريت دراسة رصدية مستقبلية على مدى ستة أشهر في مركز علاج التهاب الكبد الفيروسي بمحافظة الفيوم . تم استخدام استبيان اعد خصيصا لهذه الدراسة تم اختباره مسبقاً ومراجعته لجمع البيانات المطلوبة من ٣٤٥ مريضاً مسجلاً اشتمل علي بيانات التركيبة السكانية للمرضي والمراسة اثناء تلقي العلاج . ووفقا لبياناتنا وجدنا أن ٧٥.٧ ٪ (٢٦١ من أصل ٣٤٥) من المرضى أبلغوا عن ٣٦ عرض مختلف اثناء تلقي العلاج معظمها اعراض بسيطه لكن كان منهم ١.٢ ٪ أحداث سلبية خطيرة (SAEs) ، بما في ذلك ثلاث وفيات (٠.٩ ٪). غالبية الاعراض كانت مع المجموعه المحتويه علي الريبافيرين . من بين ٣٤٥ مريض ، ٢٣.٥ ٪ يعانون من أمراض مصاحبة أفاد ٩٢.٦ ٪ منهم عن اعراض جانبية للادويه. وكشف تقييم السببية للاعراض الجانبية وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية - UMC أن ٣٨.٨٩ ٪ اعراضا محتملة بينما ٦١.١١ ٪ اعراضا ممكنة الحدوث . وبناء عليه تتطلب الأدوية المضادة للفيروسات متابعة دقيقة لأي حدث ضار قد يحدث اثناء او بعد تلقي العلاج .كما يجب التعامل مع المرضي كبار السن وذوي الأمراض المصاحبة بحذر لتجنب تطور آثار جانبية خطيرة.