

فعالية وسلامة السوفوسبوفير و الدكلتاسيفير مع أو بدون الريبافيرين في المرضى المسنين المصابين بعدوى الالتهاب الكبدي الفيروسي سي المزمن

Efficacy and safety of sofosbuvir and daclatasvir with or without ribavirin in elderly patients with chronic hepatitis C virus infection

Tamer Elbaz, Mahmoud Abdo, Heba Omar, **Essam A. Hassan**, Amr M. Zaghloul, Mohamed Abdel - Samiee, Ahmed Moustafa , Abdallah Qawzae, Mostafa Gamil, Gamal Esmat.

المشاركون في البحث :- تامر الباز-محمود عبدو- هبة عمر - **عصام على حسن**—عمرو زغلول- محمد عبد السميع- احمد مصطفى – عبد الله قوازي- مصطفى جميل – جمال عصمت

قسم الامراض المعدية وأمراض الكبد المتوطنة ، كلية الطب ، جامعة القاهرة، الجيزة ، مصر
قسم الأمراض المتوطنة – كلية الطب – جامعة الفيوم، الفيوم ، مصر
قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي ، جامعة سوهاج ، سوهاج ، مصر
قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي ، المعهد القومي للكبد ، جامعة المنوفية ، شبين الكوم ، مصر
قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد ، مستشفى احمد ماهر التعليمي ، القاهرة ، مصر
قسم الباطنه ، أولم مستشفى الجامعة ، أولم ، ألمانيا

مكان النشر بحث منشور في

Journal of Medical Virology 2019

ملخص البحث

تعتبر عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي) مشكلة صحية كبرى في جميع أنحاء العالم ، وتؤثر بشكل مزمن على ١٧٠ مليون شخص. ويعتبر المرضى المسنون أكثر عرضه للمضاعفات من المرضى الأصغر سنا نظرا لطول مدة الإصابة وزيادة معدل تطور المرض وبالتالي زيادة احتمالات حدوث الاصابه بامراض الكبد المختلفه . وقد توقعت الابحاث الطبيه انتشار عواقب ومضاعفات عدوى الالتهاب الكبدي الفيروسي سي المزمن خلال العقد المقبل ، وسوف تؤثر في الغالب علي أولئك الذين هم أكبر من ٦٠ سنة من العمر. لان تقدم العمر يرتبط مع زيادة تطور تليف الكبد وسرطان الكبد. ولذلك فان المرضى كبار السن في حاجة خاصة لعلاجات آمنة مضادة للفيروسات. وهذا ما قد تحقق في الآونة الأخيرة باستخدام مضادات الفيروسات المباشرة و الخاليه من الانترفيرون حيث حدث زياده في معدلات الشفاء الإجمالية التي تجاوزت ٩٠ ٪ ، مع مضاعفات اقل و حسب هذه الدراسه التي شملت ٢٨٥ مريض تم تقييم الحالات المرضيه المصاحبه مثل الضغط والسكري والقلب وامراض الصدر كما تم تقييم الاستجابه للعلاج ومتابعة الاثار الجانبيه للعلاج واطهرت النتائج ان نسبه الاستجابه للعلاج بلغت ٩١% و كانت اكثر الاعراض الجانبيه شيوعا هي الاجهاد (١٦ مريضا ، ٥.٦ ٪) ، وفقر الدم الخفيف (١٢ مريضا ، ٤ ٪) ، وعدم تكافؤ الكبد (٦ مرضى ، ٢ ٪). وقد اثبتت الدراسه فعالية وسلامة الاستخدام الثنائي للسوفوسبوفير و الدكلتاسيفير ، مع أو بدون ريبافيرين ، في علاج مرضى التهاب الكبد الفيروسي سي المزمن المسنين الذين هم أكثر من ٦٠ سنة.