

البحث الرابع

دراسة مستقبلية عشوائية بين طريقة بارباجلى و طريقة اسوبا فى استخدام رقعة من الغشاء المبطن للدم فى تصليح ضيق مجرى البول الامامى

المشتركون في البحث: د/ حسين الدقادوسي، اد/ سمير الجمل، د/ محمد البندارى، اد/ اسامه الجمل

ادم/ محمد رضوان ، د/ محمد جابر بسطويسي سليمان

جهة و تاريخ النشر: بحث منشور فى Int J Urol. مجلد (٢١) عدد رقم (٢) فبراير سنة ٢٠١٣ من صفحة (١٨٥-١٨٨)

الملخص العربي

الهدف: مقارنة طريقة بارباجلى و طريقة اسوبا فى تصليح ضيق مجرى البول الامامى.

طريقة البحث: من يناير ٢٠١٠ الى مايو ٢٠١٢ ، ٤٧ حالة يعانون من ضيق طويل بمقدمة مجرى البول و تم تقسيمهم الى مجموعتين. الاولى تشمل ٢٥ مريض و تم التصليح بطريقة بارباجلى باستخدام رقعة من الغشاء المبطن للدم و الثانية تم التصليح بطريقة اسوبا باستخدام رقعة من الغشاء المبطن للدم.

النتائج: كانت نسبة النجاح الكلية ٨٨٪ حيث كانت ٤٪ في المجموعة الاولى. كان متوسط مدة العملية في المجموعة الاولى ٢٠٥ دقيقة و ١٢٨ دقيقة في المجموعة الثانية. كانت نسبة نزف الدم أعلى في المجموعة الاولى.

الاستنتاجات: بمقارنة طريقة بارباجلى و طريقة اسوبا في استخدام رقعة من الغشاء المبطن للدم في تصليح ضيق مجرى البول الامامى تبين أنهم يعطوا نفس النتائج ولكن طريقة اسوبا أسهل وأقصر في المده و أقل في نسبة الدم المفقود و أقل في المضاعفات.