

Al-Kandari A, M, Kehinde E, O, Khudair S, **Ibrahim H**, ElSheemy M, S, Shokeir A, A, Intermittent Testicular Torsion in Adults: An Overlooked Clinical Condition. Med PrincPract 2017;26:30-34

ملخص البحث:

هدف الدراسة هو وصف بروتوكول لعلاج حالات اختناق الخصبة المتقطع عند الكبار وعرض لنتائج هذه الحالات الغير مدركة عند كبار السن وتضمنت الدراسة عدد ثلاثة وستون مريضاً يعانون من الالام مفاجئة ومتقطعة على مدى ثلاثة أشهر وقد تم فحص جميع المرضى اكلينيكيًا و أيضاً عمل تحليل بول ومزرعة وفحص الموجات الصوتية للخصية وأوعيتها الدموية وقد تم اجراء تدخل جراحي لعدد ١٩ مريض والعلاج التحفظي لعدد ٤٤ مريضاً وذلك بناء على اختيارهم. تم متابعة جميع المرضى لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنتين. وأظهرت النتائج أن متوسط عمر المرضى كان ٢٨ عاماً وكانت نسبة التحسن باختفاء الألم عند المرضى الذين تم التدخل الجراحي لهم يعادل ٩٤.٠٧% في حين أن نسبة التحسن في المرضى الذين تم علاجهم تحفظياً هو ٤٧.٠٧% وذلك طبقاً لنظام القياس المتبع في الدراسة. لذا تخلص الدراسة إلى أن التدخل الجراحي لمثل هذه الحالات أفضل بكثير عن العلاج التحفظي.