



بحث (4) مشتق من رسالة دكتوراة

تأثير إرشادات التمريض المحددة على حدوث المضاعفات لدى المرضى الذين يخضعون لأنبوب فغر الكلية عن طريق الجلد

زينب حسين علي¹، شيماء محمد محمد²، محمد محمود سيد أحمد³

¹أستاذ التمريض الجراحي الطبي، كلية التمريض جامعة حلوان، مصر.

²مدرس مساعد التمريض الجراحي الطبي، كلية التمريض جامعة الفيوم، مصر.

³مدرس جراحة المسالك البولية، كلية الطب جامعة الفيوم، مصر.

ملخص

يتم إدخال أنبوب فغر الكلى مباشرة في نظام تجميع الكلى للسماح بتصريف البول بشكل دائم أو مؤقت. قد تحدث العديد من المضاعفات إما من إجراء الإدخال أو وجود القسطرة في الجسم.

هدف الدراسة: تقييم تأثير إرشادات التمريض المحددة على حدوث المضاعفات لدى المرضى الذين يخضعون لأنبوب فغر الكلى عن طريق الجلد.

تصميم البحث: تصميم شبه تجريبي.

المكان: قسم جراحة المسالك البولية والعيادة الخارجية لأمراض المسالك البولية في مستشفى جامعة الفيوم.

الطرق: عينة مقصودة من 60 مريضاً بالغاً، تم تجنيدهم عشوائياً في مجموعتين متساويتين (30 مريضاً في كل منهما).

الأدوات: تشمل استبيان المقابلة المنظمة، استبيان تقييم معرفة المرضى، قائمة مراجعة ممارسة المرضى، قائمة مراجعة مضاعفات أنبوب فغر الكلى عن طريق الجلد.

النتائج: كان هناك فرق إحصائي كبير بين المجموعتين فيما يتعلق بالمعرفة وممارسات الرعاية الذاتية (قيمة $P < 0.001$) ومعدل حدوث المضاعفات بعد تطبيق المبادئ التوجيهية للتمريض مع نسبة أعلى من المضاعفات بين مجموعة المراقبة.

الاستنتاج: كان لتطبيق المبادئ التوجيهية تأثير إيجابي على نتائج المرضى الذين خضعوا لأنبوب فغر الكلية عن طريق الجلد.

التوصيات: يجب على الممرضات تطبيق الأداة التعليمية التي من شأنها مساعدة المرضى على تحسين ممارسات الرعاية الذاتية لديهم للوصول إلى نتائج إيجابية.

الكلمات المفتاحية: المضاعفات، أنبوب فغر الكلية، المبادئ التوجيهية

European Chemical Bulletin, Accepted: 11.05.2023, DOI:

10.48047/ecb/2023.12.si4.718