

بسم الله الرحمن الرحيم

نموذج رقم " ١ "

استمارة ملخص بحث بواسطة المتقدم

اسم المتقدم:- د. شربات ثابت حسنين

لوظيفة المتقدم لها الباحث: أستاذ مساعد

رقم البحث (1) نوعه :- (مشترك)

عنوان البحث باللغة العربية:-

تأثير التدليك على النمو والتطور لدى الاطفال الذين لديهم انخفاض فى الوزن عند الولادة

بيانات نشر البحث:

مقبول للنشر: () التاريخ: / / ٢٠٠ منشور : (√) التاريخ: 2015

المشاركون فى البحث:

د. شربات ثابت حسنين مدرس تمريض صحة مجتمع – كلية التمريض جامعة الفيوم

د. زينب جزر القطب العجمي مدرس تمريض صحة مجتمع (مسنين) جامعة الفيوم

مكان النشر:

The 7thInternational Scientific Nursing Conference 2015- Faculty of
Nursing – Helwan university

هل البحث معتمد على رسالة علمية نعم () لا (√)

ملخص البحث باللغة العربية :

المقدمة: اطفال الوزن المنخفض عند الولادة هم الاطفال الذين يقل وزنهم عن ٢.٥٠٠ جرام عند ولادتهم، بغض النظر عن عمر الحمل ، يعتبر وزن الولادة مؤشراً مهماً على صحة حديثي الولادة بسبب العلاقة الوثيقة بين وزن الولادة ووفيات المواليد. إن انخفاض الوزن عند الولادة الطفل يكون أكثر عرضة لسوء الصحة أو الوفاة ، ويتطلب فترة أطول من الاستشفاء بعد الولادة ، ومن المرجح أن يصابوا بإعاقات كبيرة. قد يكون الطفل منخفض الوزن عند الولادة أكثر عرضة للعديد من المشاكل الصحية. قد يصاب بعض الأطفال بالمرض في الأيام الستة الأولى من حياتهم أو يصابون بالعدوى. وقد يعاني من مشاكل طويلة الأمد مثل تأخر الحركة أو النمو الاجتماعي أو صعوبات التعلم. وقد أظهرت الأبحاث أن التدليك للجسم يمكن أن يحفز التطور العصبي عن طريق تعزيز نمو المايلين ، المادة التي تحيط بالخلايا العصبية. الوجود الكافي للمايلين يزيد من سرعة وكفاءة وظيفة الخلايا العصبية. الجهاز الهضمي يبدو أيضاً أنه يستفيد من التدليك ، عن طريق زيادة إفراز هرمونات الجهاز الهضمي. هذا قد يكون مصدراً آخر للنمو المحسن في الطفل ، فضلاً عن انخفاض في اضطرابات الجهاز الهضمي مثل المغص. كما يبدو أن تدليك الرضع يقلل من سرعة وقت النوم بالإضافة إلى تحسين عادات النوم الليلية

الهدف: تهدف الدراسة إلى تقييم تأثير التدليك على نمو وتطور الأطفال منخفضي الوزن عند الولادة

فرضية البحث

تحسين النمو والتطور لمجموعة الدراسة من الأطفال منخفضي الوزن عند الولادة بعد تطبيق التدليك

تصميم البحث تم استخدام تصميم شبه تجريبي في هذه الدراسة

مكان البحث أجريت الدراسة في العيادة الخارجية لأمراض الأطفال المبتسرين في مستشفى أبو الريش ، ومستشفى المنيل بمستشفى قصر العيني..
العينة: عينة هادفة من الأطفال منخفضي الوزن عند الولادة وأمهاتهم ، كان العدد الإجمالي (٨٦) ، مقسمة إلى مجموعتين ، مجموعة الدراسة (٤٣) ومجموعة المراقبة (٤٣) ، يتم اختيارهم عشوائيا.

أدوات جمع البيانات

أولا- استمارة تقييم الطفل منخفض الوزن عند الولادة
يتكون من ثلاثة أجزاء على النحو التالي:
الجزء (١): أداة قياس النمو الجسدي ، لتقييم النمو الجسدي للطفل منخفض الوزن عند الولادة: مثل ، الوزن عند الولادة ، الطول ، محيط الصدر والرأس ، المتابعة للأطفال تمت كل شهر حتى ٤ أشهر
الجزء (٢): أداة تقييم النمو
ويتكون من أربعة أجزاء: اجتماعية / شخصية ، وظيفة حركية دقيقة ، لغة ، وظائف حركية إجمالية ، تم استخدام هذا المقياس لتقييم تطور الأطفال منخفضي الوزن عند الولادة.
الجزء (٣): أداة تقييم المشكلات الصحية
تم استخدامه لتقييم المشاكل الصحية للأطفال منخفضة الوزن عند الولادة مثل: مشاكل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والبولي والعصبي وتكرارها للطفل.
ثانيا: استمارة مقابلة شخصية للأمهات اللاتي لديهن أطفال منخفض الوزن عند الولادة: تتكون من جزأين
الجزء (١) أداة التقييم الاجتماعي الديموغرافي
لتقييم الخصائص الاجتماعية الديموغرافية لمجموعة الدراسة مثل العمر ، والإقامة ، وحجم الأسرة ، والمستوى التعليمي ، والمهنة ، وعمر الحمل.
الجزء (٢): أداة تقييم معارف الأمهات
تم استخدامه لتقييم معرفة الأمهات المتعلقة بتعريف الطفل منخفض الوزن عند الولادة وأسبابه ومضاعفاته وتقنية تدليك الطفل وتأثير التدليك على الأطفال
النتائج:

وكشفت الدراسة الحالية أن حوالي ثلثي مجموعة الدراسة كان أقل تكراراً للمشاكل الصحية مقارنة بأكثر من ثلث مجموعة التحكم، مع وجود فرق ذو دلالة إحصائية بين المجموعتين. أيضا حوالي ثلثي مجموعة الدراسة مقارنة بأكثر من عشر مجموعة التحكم، كان لديهم معدل نمو جيد ، ولكن غالبية مجموعة الدراسة مقارنة بحوالي ثلثي مجموعة التحكم ، كان لديها نمو طبيعي ، مع وجود فرق إحصائي بين المجموعتين.
بينت الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المستوى المرضي للأمهات وانخفاض النمو عند الولادة ، ومشاكل النمو والصحة في المجموعتين ، كما أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين انخفاض النمو والوزن عند الولادة ، والمشاكل الصحية في المجموعتين.

الاستنتاج

بعد تطبيق تدليك للأطفال منخفضي الوزن عند الولادة لمجموعة الدراسة ، كان لديهم معدل نمو وتطور أعلى من مجموعة التحكم ، وكانوا أقل تكرار للمشاكل الصحية من مجموعة التحكم مع وجود فرق إحصائي كبير بين المجموعتين.

التوصيات

استناداً إلى نتائج البحث ، تم اقتراح التوصيات التالية:

- إجراء برامج تعليمية مختلفة مستمرة للأمهات الحوامل عالية المخاطر في العيادات الخارجية لزيادة الوعي حول الأسباب والوقاية والكشف المبكر عن الولادة لأطفال لديهم انخفاض الوزن عند الولادة.
- تصميم كتيب إرشادي بسيط موضح باللغة العربية للأمهات الأطفال منخفضي الوزن عند الولادة حول تأثير التدليك على النمو وتطور الأطفال منخفضي الوزن ، تقنية تدليك الطفل.
- ينصح تكرار هذه الدراسة على عينة أكبر ، على نطاق واسع وإعدادات مختلفة من الدراسة من أجل تعميم النتائج