

بسم الله الرحمن الرحيم

نموذج رقم " ١ "

استمارة ملخص بحث بواسطة المتقدم

اسم المتقدم:- د. شربات ثابت حسنين
لوظيفة المتقدم لها الباحث: أستاذ مساعد
رقم البحث (٣) نوعه :- (فردى)

عنوان البحث باللغة العربية:-

"كفاءة الرعاية التمريضية المساندة على نتائج الحمل بين النساء المتوقعن الولادة قبل الميعاد"

المشاركون في البحث:

د. فاطمة ابو الخير فرج: مدرس تمريض صحة الأم وحديثي الولادة جامعة الفيوم

د. شربات ثابت حسنين مدرس تمريض صحة مجتمع كلية التمريض جامعة الفيوم

بيانات نشر البحث:

مقبول للنشر: () التاريخ: / / ٢٠٠ منشور: (√) التاريخ: ٢٠١٦

مكان النشر:

Assiut Scientific Nursing Journal, ISSN 2314-8845 Vol (4), No (7), April
(2016): 138-148

هل البحث معتمد على رسالة علمية نعم () لا (√)

ملخص البحث باللغة العربية :

مقدمه :-

الولادة المبكرة هي الولادة التي تبدأ قبل نهاية الأسبوع السابع والثلاثون من الحمل ، هي أخطر مضاعفات الحمل في مصر. والتي تستدعي الراحة التامة ولذلك قد تعالج بالمستشفيات. ولكن في مجالات الخدمات الصحية الفقيرة مثل الريف، يضطر الأطباء إلى خفض تكاليف الإدارة الطبية عن طريق إخلاء المرأة في وقت مبكر وتحويلها إلى المنزل، دون برامج متابعة خاصة على النحو المبلغ عنه. وبالإضافة إلى ذلك، تعد اكتساب عدوي المستشفيات سبب جذري للولادة قبل الأوان. وعلاوة على ذلك، و قضاء الوقت في المستشفى له آثار نفسية ضارة على النساء الحوامل وعائلتها. وقد أظهر الباحثون أن الرعاية التمريضية الداعمة هي تدخل فعال في تحسين نتائج الحمل.

أهداف البحث:

و قد هدفت هذه الدراسة إلى:

دراسة مدى كفاية الرعاية التمريضية الداعمة على نتائج الحمل بين النساء اللواتي يتوقعن الولادة قبل الولادة

مكان الدراسة: المستشفى الجامعة بالفيوم زيارات منزلية

العينة

طبقت هذه الدراسة على ٨١ سيدة من المترددات على المستشفى الجامعي ، تم تقسيمهم إلى مجموعتين :المجموعة الأولى و هى مجموعة الدراسة التى طُبّق عليها برنامج العناية المدعمة للسيدات الحوامل ، وهى تتكون من ٤١ سيدة حامل أثناء فترة الحمل منذ الاسبوع الرابع والعشرون من الحمل حتي ما بعد الولادة.المجموعة الثانية فهى المجموعة الضابطة ، وهى أيضاً تتكون من ٤٠ سيدة معرضات للولادة المبكرة تلقين الرعاية في المستشفى.

طرق وأدوات البحث

تم تجميع البيانات الخاصة بالدراسة باستخدام عدة أدوات صممت بواسطة الباحث مثل :

- ١ . استمارة المقابلة الشخصية.
- ٢ . استمارة تقييم مستوي المعلومات عن الولادة المبكرة بين السيدات (امتحان قبلي).
- ٣ . استمارة التقييم و المتابعة
- ٤ . استمارة تقييم حديثي الولادة.
- ٥ . مذكرات ذاتية للحوامل لتسجيل الحالة الصحية.

نتائج البحث

أسفرت الدراسة عن النتائج التالية :-

على الرغم من أن نتائج الدراسة قيمتها تتعلق بالنتائج الأولية لحديثي الولادة كشفت عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية اعتبر نتيجة إيجابية أن يعنى كفاية الرعاية الداعمة مقارنة بالرعاية في المستشفى فيات كم
وجد اختلاف كبيراً بينا المجموعتين اتصالا حال الرعاية الداعمة قيمتها تتعلق بالنتائج المهمة كما أقصر مدة البقاء والدخول الى المستشفى.

الخلاصة:

أيدت نتائج الدراسة فرض البحث وهو أن " السيدات الحوامل اللاتي خضعن إلى رعاية تمريضية مدعمة ستجد نتائج حمل أفضل من السيدات اللاتي لم تخضعن الي هذه الرعاية".

التوصيات:

يجب أن تعتبر الرعاية المنزلية بديلا لصال الحلالرعاية في المستشفى فيات
بين النساء اللواتي يتوقعن الولادة المبكرة قوينيغيتصميمبروتوكولاتالرعاية التمريضية الداعمة للنساء الحوامل المعرضات لخطر مرتفع أثناء الحمل.