

بحث رقم "1"

عنوان البحث باللغة العربية:

تأثير برنامج التمكين لمقدمي الرعاية على جودة حياة الأطفال المصابين بالشلل الدماغي

أسماء المشاركين في البحث:

أسماء الباحثين	القسم	الكلية – الجامعة	التوقيع
ام د مرفت امين سيد	استاذ مساعد تمريض صحة مجتمع	التمريض – الفيوم	
د. هويدا حمدي عبدالمنعم	مد رس تمريض الاطفال	التمريض- الفيوم	
د فرنسا على احمد	مد رس تمريض الاطفال	التمريض – الفيوم	

مكان وتاريخ نشر البحث: Egyptian Journal of Health Care, 2021 EJH Vol.12 no.1

هل البحث معتمد على رسالة علمية: نعم () لا (√)

ملخص البحث باللغة العربية:

مقدمة:

الشلل الدماغي (CP) هو مجموعة متعددة من الاضطرابات الناجمة عن إصابة الدماغ أو التعرض لاصابه في وقت ما قبل الولادة ، أثناء الولادة ، أو بعد الولادة ، مما تسبب في إعاقة نمو رئيسية لها تأثير غير مرغوب فيه على الطفل والقائمين على رعايتهم طوال حياة الطفل. يتميز بعدم القدرة على التحكم في الوظائف الحركية ، والوضع والتوازن ، كما انه يؤثر على نمو الطفل وقدرته على الاستكشاف والتعلم والتحدث والاستقلال.

الهدف من الدراسة: طرق و أدوات البحث :

هدف هذه الدراسة إلى تقييم فعالية برنامج التمكين لمقدمي الرعاية على جودة حياة الأطفال المصابين بالشلل الدماغي

طرق جمع البيانات:

تصميم البحث :

تم استخدام تصميم بحث شبه تجريبي لهذه الدراسة

مكان الدراسة: أجريت هذه الدراسة في العيادات الخارجية للعصبيه للاطفال بمستشفيات جامعة عين شمس/بالقاهره .
عينة البحث:

عينه هادفه شملت على 75 طفلاً ومقدمي الرعاية لهم في الامكان سابقة الذكر

الأدوات المستخدمة لجمع البيانات: بعد مراجعة الموضوعات الأدبية ذات الصلة بالدراسة استخدمت الأدوات الاتية لجمع البيانات.

تم استخدام أربع أدوات لجمع البيانات، إستبيان المقابلة الشخصية لجمع البيانات الديموغرافية والاجتماعية للأطفال ومقدمي الرعاية لهم، واداة انشطة الحياة اليومية ، واداة جودة حياة الطفل ، ومقياس تمكين الأسرة.

النتائج: قد أسفرت نتائج الدراسة الحالية عما يلي :

اظهرت النتائج أن 74.7% من الأطفال كانوا معتمدين جزئيًا في القيام بالأنشطة اليومية ، بينما 50.7% منهم اصبحوا غير معتمدين بعد البرنامج ($p < 0.01$). كما يوجد ايضا دلالة احصائية $p < 0.05$ فيما يتعلق بالوظيفة الجسدية والنفسيه والاجتماعية قبل وبعد البرنامج، ولكن لم يكن هناك فرق كبير بين متوسط الدرجات فيما يتعلق بالمدرسة قبل وبعد البرنامج ($p > 0.05$).

الخلاصة:

وفقًا للنتائج وفرضية البحث ، خلصت الدراسة إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع مقدمي الرعاية الذين شملتهم الدراسة أفادوا أن أطفالهم المصابين بالشلل الدماغي لديهم جودة منخفضة قبل برنامج التمكين ، في حين أن برنامج ما بعد التمكين ، ذكر أكثر من ثلث الأطفال المصابين بالشلل الدماغي حياة اصبحت معتدلة الجودة. وفي الوقت نفسه ، فيما يتعلق بجودة الحياة الإجمالية ، كان هناك فرق كبير بين متوسط الدرجات قبل برنامج التمكين وبعده (قيمة $p < 0.01$). في النهاية ، كان لبرنامج التمكين لمقدمي الرعاية تأثير إيجابي على جودة الحياة لأطفال الشلل الدماغي .

التوصيات:

- اعداد برامج التمكين باستمرار لمقدمي الرعاية للأطفال المصابين بالشلل الدماغي
- مزيد من الأبحاث حول جودة حياة الأطفال المصابين بالشلل الدماغي مع زيادة حجم العينة في بيئات مختلفة
- توفير كتيب الإرشادات لجميع الأطفال المشخصين حديثًا بالشلل الدماغي في جميع العيادات الخارجية للأمراض العصبية ومراكز إعادة التأهيل لمساعدتهم في تحسين معارفهم وممارساتهم وامدادهم بالمعلومات .