

## " كفاءة الرعاية التمريضية المساندة على نتائج الحمل بين النساء المتوقعن الولادة قبل الميعاد "

### ملخص البحث باللغة العربية:

لا يزال منع الولادة المبكرة أحد أهم التحديات في مجال رعاية الأمومة. وقد أظهر الباحثون أن الرعاية التمريضية الداعمة الكافية هي تدخل فعال في تحسين نتائج الحمل. الهدف: تهدف الدراسة الحالية إلى دراسة مدى كفاية الرعاية التمريضية الداعمة (من التوجيه والملاحظة والإرشاد) عن طريق بعض الزيارات والاتصال التليفوني على نتائج الحمل بين النساء اللواتي يتوقعن الولادة قبل الميعاد. الأساليب: دراسة شبه تجريبية لمجموعتين (41 امرأة تلقت رعاية داعمة) ومجموعة مراقبة (40 امرأة تلقت رعايتها عن طريق دخول المستشفى). مكان الدراسة: مستشفى جامعة الفيوم والزيارات المنزلية. الأدوات: تم استخدام خمسة: استبيان مقابلة ، ورقة تقييم المعرفة (الاختبار القبلي)، كارت متابعة الحمل ، ورقة تقييم حديثي الولادة ومذكرات الرصد والمتابعة الذاتية. النتائج: لم تكن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين فيما يتعلق بمتوسط عمر الحمل ووزن الطفل عند الولادة وذلك يعني كفاية الرعاية الداعمة والتي تساوت مع الرعاية بالمستشفى وعلاوه على ذلك ، كان متوسط مدة إقامة الأمهات في المستشفى بالإضافة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعات فيما يتعلق بالمشاكل الصحية الثانوية لحديثي الولادة مثل مشاكل في الجهاز التنفسي أكثر بين النساء اللواتي تلقين رعاية بالمستشفى الاستنتاج: الرعاية التمريضية المساندة لها نتائج إيجابية للحمل أكثر من الرعاية في المستشفيات بين النساء اللواتي يتوقعن الولادة المبكرة. التوصيات: يجب أن تعتبر الرعاية المنزلية بديلاً صالحاً للرعاية في المستشفيات بين النساء اللواتي يتوقعن الولادة المبكرة وينبغي تصميم بروتوكولات الرعاية التمريضية الداعمة للنساء الحوامل المعرضات لخطر مرتفع أثناء الحمل.

**مكان النشر:** تم نشر البحث في

Assiut Scientific Nursing Journal, ISSN 2314-8845 Vol (4), No (7), April (2016): 138-148