

بسم الله الرحمن الرحيم

نموذج رقم (2)

المجلس الأعلى للجامعات

اللجنة العلمية الدائمة للتمريض

استمارة ملخص بحث بواسطة المتقدم

بيانات تستوفى بواسطة المتقدم:

اسم المتقدم: سلوى عطية محمد
القسم: التمريض الباطني والجراحي
التخصص العام: التمريض الباطني والجراحي
الوظيفة: مدرس
الكلية: التمريض
الجامعة: الفيوم
رقم البحث: 2
(مشترك)

عنوان البحث: Effect of Topical Application of Honey on Management of Chemotherapy Induced Oral Stomatitis

تأثير التطبيق الموضعي للعسل على علاج التهابات الفم نتيجة العلاج الكيماوي.

مكان و تاريخ النشر: (Life Science Journal 2012;9(4))

المؤلفون: د. سلوى عطية محمد السيد قسم تمريض باطنى وجراحي كلية التمريض جامعة الفيوم

ا.م.د. أماني محمد شبل قسم التمريض الباطني والجراحي - كلية التمريض - جامعة المنصورة

ا.د. سهير محمد وحيدة قسم التمريض الباطني والجراحي - كلية التمريض - جامعة الإسكندرية

هل البحث معتمد على رسالة: نعم () لا (✓)

ملخص البحث باللغة العربية: مازال العلاج الكيميائي هو الأسلوب الرئيسي المتبع لعلاج السرطان، ولكنه يؤدي إلى آثار جانبية على المدى القصير والطويل. وتعتبر الآثار الجانبية للفم مصدرا للمرض على الرغم من استخدام مجموعة عوامل متنوعة لمنعها. والتهاب الفم هو أحد هذه الآثار الجانبية. وهذه الالتهابات قد تؤدي إلى انزعاج وألم مع الأكل، وتؤثر علي استجابة المريض للعلاج وزيادة المخاطر المحتملة للعدوى عن طريق الفم. والهدف من هذه الدراسة هو تحديد تأثير التطبيق الموضعي للعسل في معالجة التهاب الفم لدى المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي. أجريت هذه الدراسة في قسم علاج الأورام والعيادات الخارجية في مستشفى جامعة المنصورة. العينة: تكونت عينة الدراسة من 40 من البالغين من كلا الجنسين. وقد تم تقسيم المرضى إلى مجموعتين: مجموعة الدراسة تناولت 20 مل من العسل والمجموعة الضابطة تستخدم الرعاية الروتينية في المستشفى. وقد تكونت أدوات الدراسة من قسمين لجمع البيانات وفق أهداف هذه الدراسة: البيانات الاجتماعية والديموجرافية وبيانات المريض الطبية؛ واستمارة لتقييم الفم. وأظهرت النتيجة الرئيسية للدراسة أن مجموعة الدراسة التي تناولت العسل أصبحت أكثر صحة بالنسبة لتجفيف والتهابات الفم حيث تحسنت بشكل أفضل وأسرع مقارنة مع العينة في المجموعة الضابطة التي استخدمت العلاج الروتيني في المستشفى. كما أظهر تحليل البيانات وجود فروق ذو

دلالة إحصائية بين مجموعتي الدراسة فيما يتعلق بتحسين حالة الفم لصالح مجموعة العسل عن المجموعة الضابطة. وكان التغير في الوزن بين المجموعتين ذو دلالة إحصائية في المجموعة الضابطة. وخلصت الدراسة أن العسل تسبب في شفاء أفضل لإلتهابات الفم تقريبا بين المرضى مقارنة مع المعالجة الروتينية. وأوصت الدراسة بأنه ينبغي تشجيع الممرضات للمرضى الذين يعانون من التهاب الفم على اتباع برامج تدريبية متكررة ومنتظمة للحفاظ على تحديث معلوماتهم مع ممارسات النظافة الصحية للفم.

إمضاء مقدم البحث

اسم مقدم البحث: سلوة عطية