

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المجلس الأعلى للجامعات

نموذج رقم (2)

اللجنة العلمية الدائمة للتمريض
استمارة ملخص بحث بواسطة المتقدم

بيانات تستوفى بواسطة المتقدم:

اسم المتقدم: سلوة عطية محمد
القسم: التمريض الباطني والجراحي
التخصص العام: التمريض الباطني والجراحي
الكلية: التمريض
الجامعة: الفيوم
الوظيفة: مدرس
رقم البحث: 6
(فردى)

عنوان البحث: Depressive Symptoms and Anxiety: Relationship to Social Support and Functional Status among Patients with Breast Cancer Surgery

أعراض الاكتئاب والقلق: العلاقة مع الدعم الاجتماعي والحالة الوظيفية بين المرضى الذين يعانون من جراحة سرطان الثدي

مكان و تاريخ النشر : Journal of Nursing and Health Science , Volume 3, Issue 4, Ver.I, 2014

د. سلوة عطية محمد	قسم تمريض الباطني والجراحي - كلية تمريض - جامعة الفيوم
د. صبرى أحمد بدر	قسم الجراحة العامة والاورام - كلية الطب - جامعة المنصورة

هل البحث معتمد على رسالة علمية () نعم () لا (√)

ملخص البحث باللغة العربية: سرطان الثدي هو واحد من أهم أنواع السرطان بين النساء في جميع أنحاء العالم، وهو من الضغوطات الكبير في حياة المرأة التي قد تؤثر على الحالة الصحية والوظيفية. الهدف من هذه الدراسة هو تحديد أعراض الاكتئاب والقلق وعلاقتهم مع الدعم الاجتماعي والحالة الوظيفية لمرضى جراحة سرطان الثدي. وقد استخدم المنهج الوصفي الارتباطي لهذه الدراسة في قسم الأورام ومركز الأورام بمستشفيات جامعة المنصورة. وتم جمع البيانات من 102 مريضه يخضعوا لعملية جراحة سرطان الثدي. وقد تم جمع البيانات باستخدام الأدوات التالية : (1) استمارة البيانات الديموجرافية والطبية . (2) استمارة قياس مستويات القلق وأعراض الاكتئاب. (3) استمارة قياس الدعم الاجتماعي. (4) استمارة قياس الحالة الوظيفية لمرضى سرطان الثدي . وقد أظهرت نتائج الدراسة الى أن إجمالي درجات الحالة الوظيفية تحسنت طفيفاً مع مرور الوقت من بداية تشخيص سرطان الثدي حتى أسبوع واحد بعد الجراحة. وكذلك يوجد ارتباط بين الدعم الاجتماعي والعوامل النفسية ، بينما يوجد انخفاض فى درجات الحالة الوظيفية تقريباً مع أعراض الاكتئاب والقلق وانخفاض الدعم الاجتماعي. وقد خلصت هذه الدراسة أن هناك علاقة قوية بين الضغط النفسي للمرضى والحالة الوظيفية والعوامل النفسية ،

وقد اوضحت أن أعراض الأكتئاب والقلق تتحسن عن طريق المساندة المستمرة من الأسره والأصدقاء والمتخصصين فى مجال الرعاية الصحية وقد أوصت هذه الرسالة إلى تكرار هذه الدراسة على عينة أكبر في مستشفيات مختلفة مع زيادة مدة العلاج لتعميم النتائج .

إمضاء مقدم البحث

اسم مقدم البحث: سلوة عطية محمد