

اللجنة العلمية الدائمة للتمريض
استمارة ملخص بحث بواسطة المتقدم

بيانات تستوفى بواسطة المتقدم: فتحية السيد السيد الغضبان

نوع البحث: مشترك

رقم البحث: (1)

عنوان البحث باللغة الانجليزية:

"Comparative Study between the Applications of Colostrum versus Alcohol on Cord Separation among Newborns"

عنوان البحث باللغة العربية:

" دراسة مقارنة بين تطبيق لبن السرسوب مقابل الكحول على فصل الحبل السري بين مواليد حديث الولادة "

أسماء المشاركين في البحث بالترتيب في النشر مع توضيح تخصصاتهم ووضع خط تحت اسم المتقدم:

د/ منال محمد احمد مدرس تمريض أطفال – كلية التمريض – جامعة سوهاج

د/ فتحية السيد السيد مدرس تمريض الاطفال – كلية التمريض – جامعة الفيوم

د/ نور الهدي مصطفى محمد مدرس تمريض النساء والتوليد – كلية التمريض – جامعة سوهاج

د/ حميدة علم الدين عبد الحفيظ استاذ مساعد تمريض النساء والتوليد – كلية التمريض – جامعة اسيوط

د/ ثريا محمد محمود مدرس تمريض صحة مجتمع – كلية التمريض – جامعة سوهاج

جهة وتاريخ النشر: Assiut Scientific Nursing Journal Vol , (5) No , (11) August 2017

هل البحث معتمد على رسالة: نعم () لا (√)

الخلاصة:

مقدمة: لبن السرسوب يعتبر بديلا عن غيره من المطهرات الموضعية للعناية بالحبل السري. **هدف الدراسة:** هدفت هذه الدراسة الي مقارنة فاعلية لبن السرسوب مقابل استخدام الكحول على فصل الحبل السري بين المواليد الجدد. **اداة وطرق البحث:** استخدمت دراسة شبه تجريبية أجريت في وحدة أمراض النساء والتوليد بمستشفى سوهاج ومركز صحة الأم والطفل (دار السلام عبد الله) في مدينة سوهاج ومستشفى جامعة الفيوم على 200 مولود . تم اختيار العينة عشوائيا" وتم تقسيمها عشوائياً إلى مجموعتين متساويتين. تلقت المجموعة الأولى العناية بالحبل السري بلبن السرسوب والمجموعة الثانية تلقوا رعاية الحبل السري باستخدام الكحول. تم عمل استبيان وقائمة متابعة للمتابعة علامات العدوى والنزيف وشفاء الحبل السري وفصله. **النتائج:** قد أظهرت النتائج ان الحبل السري فصل مبكرا في مجموعات لبن السرسوب مقابل المجموعات الكحولية. كما وجد ان 80 ٪ من مجموعة أطفال لبن السرسوب قد فصلت احبالهم السريه من 5 إلى 6 يوم من العمر. يوجد اختلاف ذي دلالة إحصائية كبيرة في جميع علامات التهاب السرة في اليوم الثالث. **خلصت** الدراسة علي ان لبن السرسوب له تأثير فعال في شفاء وفصل الحبل السري مبكرا. **وقد اوصت** الدراسة بضرورة الالمام الجيد من قبل الممرضات والامهات بطريقة تطبيق فصل الحبل السري باستخدام لبن السرسوب من خلال تطبيق مبدأ الممارسة المبنية على البراهين.

إمضاء مقدمة البحث

إسم مقدمة البحث