

نموذج رقم (١)  
اللجنة العلمية الدائمة للتمريض  
استمارة ملخص بحث بواسطة المتقدم

بيانات تستوفي بواسطة المتقدم: د/ حنان عبدالله محمد  
الوظيفة المتقدم لها الباحث: استاذ مساعد

نوع البحث: (جماعي)

رقم البحث (٨)  
عنوان البحث باللغة الانجليزية:

Effect of Breast Feeding on Immunization Pain Intensity level among Infants

عنوان البحث باللغة العربية:

تأثير الرضاعة الطبيعية على مستوى شدة ألم التطعيمات بين الأطفال

لا (√)

نعم ( )

البحث معتمد على رسالة علمية: -

مكان وتاريخ النشر:

Egyptian Journal of Health Care, 2022 EJHC Vol. 13 No.4

المشاركون في البحث:

د/حنان عبدالله محمد: مدرس بقسم تمريض الأطفال - كلية التمريض - جامعة الفيوم  
د/ هدي عصمت تمريض صحة المجتمع - جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا  
د.منال عبدالسلام: زميل تمريض صحة مجتمع بمستشفيات جامعة عين شمس  
أ.م. د / منال محمد أحمد عايد: استاذ مساعد بقسم تمريض الأطفال - كلية التمريض - جامعة سوهاج

ملخص البحث باللغة العربية:

مقدمة: يمكن السيطرة على الألم باستخدام الطرق الدوائية وغير الدوائية. الطريقة غير الدوائية المستخدمة هي الرضاعة الطبيعية للسيطرة على الألم وهي الطريقة المفضلة أثناء الرضاعة. الهدف من البحث: هدفت الدراسة الحالية الي تحديد تأثير الإرضاع من الثدي على مستوى شدة ألم التطعيمات بين الرضع. نوع البحث: بحث شبه تجريبي لتحقيق هدف الدراسة الحالية. المكان: تم إجراء البحث في مركز صحة الأم والطفل (دار السلام عبد الله). عينة البحث: تم تضمين عينة هادفة من ٢٠٠ أم واطفالهن وتم تقسيمهم في المجموعة الضابطة والدراسة، و ١٠٠ طفل رضيع في كل مجموعة (١٠٠ طفل رضع قبل وأثناء وبعد التطعيم و ١٠٠ لم يرضعوا من الثدي). أدوات البحث: تم استخدام أداتين: أداة (١) استبيان مقابلة منظم والأداة (٢) مقياس ألم الرضع حديثي الولادة. نتائج البحث: أظهرت النتائج أن غالبية الرضع في مجموعة الدراسة كانت تعابير وجوههم مرتخية، ونصفهم لم يبكي على الإطلاق، واسترخ نمط التنفس لدى ٦٦٪ منهم. فروق ذات دلالة إحصائية عالية بين الرضع ستة مؤشرات ألم سلوكية بما في ذلك تعبيرات الوجه والبكاء ونمط التنفس والذراعين والساقين وحالة الاستيقاظ في مجموعة الدراسة ومجموعات المراقبة. كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الألم للرضع بعد التطعيم في الدراسة ومجموعات المراقبة (عند  $P < 0.0001$ ). في مجموعة الدراسة، لم يعاني أكثر من نصف الأطفال من أي ألم مقارنة بجميع الأطفال في المجموعة الضابطة الذين شعروا بالألم. الخلاصة: بناءً على نتائج الدراسة الحالية خلصت الدراسة إلى أن الرضاعة الطبيعية لها تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية عالية للطريقة غير الدوائية لتقليل مستوى شدة ألم التحصين بين الرضع المدروسين في مجموعة الدراسة مقابل مجموعة التحكم. كانت شدة الألم أقل بشكل يعد به بين الرضع الذين تم تناولهم التحصين أثناء الرضاعة الطبيعية. التوصيات: أوصت الدراسة الحالية باستخدام الرضاعة الطبيعية أثناء التطعيم كتدخل لتقليل الألم عند الرضع. حيث إنه يحتاج إلى وقت أقل، وأقل جهد، وهو فعال من حيث التكلفة بدون آثار جانبية يمكن استخدامه بسهولة في البيئات السريرية. مطلوب تكرار الدراسة الحالية مع عينة أكبر من الرضع في بيانات مختلفة لتعميم النتائج.

توقيع مقدم البحث

مقدم البحث  
د. حنان عبدالله محمد