

البحث الاول

سرطان الأرومات المينائية الأولية: مراجعة النشرات الطبية مع سلسلة الحالات .

Sarah Ahmed Mohamed Mahmoud, Hatem Wael Amer, Sally Ibrahim Mohamed

منشور بالمجلة البولندية للباثولوجي

مجلد ٦٩، العدد ٠٣

2018

الملخص العربي

سرطان الأرومات المينائي (AC) هو نوع نادر للغاية من الأورام الخبيثة السنوية الناشئة عن ظهارة سنية المنشأ. تم تصنيفها إلى النوع الأولي والنوع الثانوي. كشفت دراسة سابقة أن حالات سرطان الأرومات المينائية الأولية كانت مرتبطة بالتوقعات الأكثر ملاءمة أكثر من الحالات الثانوية.

الهدف من العمل الحالي :

الإبلاغ عن الحالة السريرية ، والتشريحية، والنسجية الكيميائية المناعية ، والصيغة الصبغية، والتفاصيل العلاجية لأربع ، ومراجعة النشرات الطبية فيما يتعلق بالمعلومات السريرية ، والمتابعة ،(AC) حالات من سرطان الأرومات الأولي المتوقع ، والتشريح المرضي ، والمعلومات المناعية لسرطان الأرومات الأولي. تم البحث في قاعدة بيانات ميد لاين باستخدام مصطلح (سرطان الأرومات المينائية) و(النوع الأولي) . كشفت مراجعة النشرات الطبية الإنجليزية أن سرطان الأرومات المينائي الأولي يفضل الفك السفلي الخلفي مع ميل عميق للذكور ويظهر على شكل شفافية إشعاعية غير محددة. من المرجح أن يحدث ورم خبيث وغزو في حالات الفك العلوي. العلاج المفضل هو الاستئصال الجراحي الواسع مع أو بدون تشريح العقدة الليمفاوية العنقية. العلاج الإشعاعي المساعد بعد الجراحة مفيد في حالات الاستئصال غير المكتمل وغزو الأنسجة الرخوة المتقدم. أكثر طرق التشخيص المحددة للـ AC هي α -SMA (الأكتين العضلي الاملس) في الخلايا الظهارية بالتزامن مع قيمة مؤشر Ki-67 (مؤشر يوضح النسبة المئوية للخلايا السرطانية المصبوغة بشكل إيجابي بين العدد الإجمالي للخلايا الخبيثة) (عامل الحماية من الشمس) SPF بنسبة أكثر من ١١%